

Clean-Trace™ Test

-
-  (EN) Surface Protein Allergen Test
 -  (FR) Test Surface Protein Allergen
 -  (DE) Oberflächen Protein Allergen Test
 -  (IT) Test Surface Protein Allergen
 -  (ES) Test Proteínas Alergénicas en Superficie
 -  (NL) Oppervlakte allergenen eiwittest
 -  (SV) Surface Protein Allergen Test
 -  (DA) Overflade Protein Allergen Test
 -  (NO) Protein allergentest til overflate
 -  (FI) Surface Protein Allergeeni pintatesti
 -  (PT) Teste de Proteína Alergénicas de Superfície
 -  (EL) Τεστ Επιφανειών Protein Αλλεργιογόνου Πρωτεΐνης
 -  (PL) Test do detekcji alergenów na powierzchni
 -  (HU) Felszíni Fehérje Allergén Teszt
 -  (CS) Alergenový test Povrchový protein
 -  (RO) Proteine de suprafață Test alergenic
 -  (RU) Тест для определения белка (аллергена) на поверхности
 -  (TR) Yüzey Protein Alerjen Testi
 -  (JA) アレルゲン残留測定
 -  (ZH) 表面过敏原采样棒



Clean-Trace™

Product Instructions

Surface Protein Allergen Test

Product Description and Intended Use

The 3M™ Clean-Trace™ Surface Protein Allergen Test is based on the Biuret reaction. Under alkaline conditions the copper ions (Cu^{2+}) form a complex with peptide bonds of protein and become reduced to Cu^+ . Bicinchoninic acid (BCA) under alkaline conditions is a highly sensitive, stable and specific reagent which forms a purple complex with Cu^+ . The test provides an estimation of protein by means of a color change. The 3M Clean-Trace Protein Allergen Test is a sensitive protein detection swab, with a detection limit of approximately 3 μg of total protein (using Bovine Serum Albumin as control). The absolute limit will vary with the protein composition of samples tested. When testing surfaces, equipment and rinse solutions, it is important to note that a residue may contain a mixture of allergenic and non-allergenic proteins, as well as non-protein materials.

To provide some guidance on the interpretation of results, testing at 3M has shown that a positive 3M Clean-Trace Protein Allergen Test result could equate to the presence of the following approximate minimum amounts of allergenic products:

Reference Material

Allergen Detection Limit	Material Used	Protein Content (%)
Egg 10-20 μg	NIST SRM8415 Whole egg powder	30
Milk 10-20 μg	NIST SRM8435 Whole milk powder	25.9
Peanut 25-50 μg	NIST SRM2387 Peanut butter	22.2
Gluten 40 μg	Gluten flour (locally sourced)	~83
Soy 20-40 μg	Soy flour (locally sourced)	~46.5
Almond 20-40 μg	Whole almond (locally sourced)	~19.5
Buckwheat 20-40 μg	Buckwheat flour (locally sourced)	~13

The 3M Clean-Trace Protein Allergen Test can be used to detect protein residues on surfaces and in solution, and thereby determine if cleaning has been effective in eliminating proteins, including potentially allergenic proteins. However, the interpretation of results will vary, depending on the specific application, so it is recommended that users validate the method for their specific requirements.

⚠️ Warnings

Consult the Safety Data Sheet for additional information and local regulations for disposal.

⚠️ Cautions

Protein is a common substance. It is present on skin, hair and on many surfaces. Do not touch the swab or the surface to be tested.






Do not use the 3M Clean-Trace Protein Allergen Test past expiry date.

The 3M Clean-Trace Protein Allergen Test detects protein and so will not detect residues of products with low or zero protein present.

Although the 3M Clean-Trace Protein Allergen Test is very sensitive, a surface cannot be considered allergen-free on the basis of a 3M Clean-Trace Protein Allergen Test result.

There is minimal interference with most common sanitizers at normal concentrations. However high concentrations of alkaline cleaners may cause false negative results in some instances.

Peroxide based disinfectants can cause a false positive color change reaction with the 3M Clean-Trace Protein Allergen Test.





User Responsibility

Users are responsible for familiarizing themselves with product instructions and information. Visit our website at www.3M.com/foodsafety, or contact your local 3M representative or distributor for more information.

When selecting a test method, it is important to recognize that external factors such as sampling methods, testing protocols, sample preparation, handling, and laboratory technique may influence results.

It is the user's responsibility in selecting any test method or product to evaluate a sufficient number of samples with the appropriate matrices and microbial challenges to satisfy the user that the chosen test method meets the user's criteria.

It is also the user's responsibility to determine that any test methods and results meet its customers' and suppliers' requirements.

As with any test method, results obtained from use of any 3M Food Safety product do not constitute a guarantee of the quality of the matrices or processes tested.

Limitation of Warranties / Limited Remedy

EXCEPT AS EXPRESSLY STATED IN A LIMITED WARRANTY SECTION OF INDIVIDUAL PRODUCT PACKAGING, 3M DISCLAIMS ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE. If any 3M Food Safety Product is defective, 3M or its authorized distributor will, at its option, replace or refund the purchase price of the product. These are your exclusive remedies. You must promptly notify 3M within sixty days of discovery of any suspected defects in a product and return it to 3M. Please call Customer Service (1-800-328-1671 in the U.S.) or your official 3M Food Safety representative for a Returned Goods Authorization.

Limitation of 3M Liability

3M WILL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS. In no event shall 3M's liability under any legal theory exceed the purchase price of the product alleged to be defective.

Storage and Disposal

For maximum shelf life, store between 2-25°C (36-77°F). Alternatively, swabs are stable for 14 days when shipped or stored at elevated temperature; for this storage option do not exceed 35°C (95°F). Expiry date and lot number are noted on each pouch. After use, may contain microorganisms that may be a potential biohazard. Follow current industry standards for disposal.

Instructions for Use

Before beginning the test procedure, ensure the dry bath, water bath, or incubator is turned on and set for 55°C (131°F).

1. Place the 3M Clean-Trace Protein Allergen Test at room temperature for at least 10 minutes before use. Grip the sample stick handle and remove the swab from the device. On dry surfaces use the moisturizer provided and apply 4 drops to the swab OR apply 4 drops to the surface to be tested [figure 1].
2. Swab the test area. Where practical, swab an area approximately 10 cm by 10 cm and swab the area in one direction and then swab the area in the opposite direction [figure 2]. Apply pressure on the swab and rotate the swab as the sample is collected to ensure repeatable and effective sampling [figure 3]. To test a solution, dip the swab into the sample and remove any excess liquid on the side of the vessel.

Note: Test for the presence of sanitizing agent (e.g. pH check) in liquid samples if a solution is tested.

3. Reinsert the sample stick into the test with the handle inserted to the original position of the unused test. At this point you can either activate and measure immediately, or, if it is more convenient, the 3M Clean-Trace Protein Allergen Test may be labeled and left un-activated for up to four hours before activation and measurement of multiple swabs simultaneously.
4. To process the sample, push down firmly on the top of the 3M Clean-Trace Protein Allergen Test sample stick handle [figure 4]. The handle will slide into the device tube and the top of the handle should be level with the top of the device tube when fully depressed. Grip the top of the device and shake rapidly side-to-side for at least five seconds to mix the sample and reagent [figure 5]. The solution will turn mint green.
5. Place the 3M Clean-Trace Protein Allergen Test into a heating block that has been preheated to 55°C (131°F). Heat for 15 minutes at 55°C (131°F). Compare the color of the swab and the solution against the 3M Clean-Trace Protein Allergen Test label. Record the strongest color change in the solution or swab as the end result.



How to best utilize 3M Clean-Trace Surface Protein Allergen Test	
Do	Do Not
Hold the 3M Clean-Trace Protein Allergen Test in the VERTICAL position on activation and shake rapidly from SIDE TO SIDE for at least 5 seconds.	Activate when not in the vertical position, do not shake up and down, do not shake aggressively.
Incubate 3M Clean-Trace Protein Allergen Test vertically.	Incubate 3M Clean-Trace Protein Allergen Test horizontally.
Read 3M Clean-Trace Protein Allergen Test at 15 minutes.	Record any color change after 15 minutes.

Interpretation

The color of the test reaction will indicate the level of protein residues on the surface. By comparing the color produced against the 3M Clean-Trace Protein Allergen Test label an estimation of the surface cleanliness can be made.

- Green indicates a Pass result - Clean, no further action required.
- Grey is inconclusive – Re-clean and Re-test is recommended.
- Purple indicates a Fail result - Re-clean and Re-test.

On heating the mint green color fades and becomes clear with a blue tint for negative samples; the green color returns on cooling shortly after removal from the heating block. To aid interpretation, comparison to a negative control is recommended.

For further information, contact 3M Food Safety Technical Services.

Explanation of Symbols

www.3M.com/foodsafety/symbols

3M Food Safety

3M United States

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-800-328-6553

3M Canada

Post Office Box 5757
London, Ontario N6A 4T1
Canada
1-800-563-2921

3M Latin America

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-954-340-8263

3M Europe and MEA

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Strasse 1
D41453 Neuss/Germany
+49-2131-14-3000

3M United Kingdom PLC

Morley Street, Loughborough
Leicestershire
LE11 1EP
United Kingdom
+(44) 1509 611 611

3M Österreich GmbH

Euro Plaza
Gebaude J, A-1120 Wien
Kranichberggasse 4
Austria
+(43) 1 86 686-0

3M Asia Pacific

No 1, Yishun Avenue 7
Singapore, 768923
65-64508869

3M Japan

3M Health Care Limited
6-7-29, Kita-Shinagawa
Shinagawa-ku, Tokyo
141-8684 Japan
81-570-011-321

3M Australia

Bldg A, 1 Rivett Road
North Ryde, NSW 2113
Australia
611300 363 878



3M Health Care

2510 Conway Ave
St. Paul, MN 55144 USA
www.3M.com/foodsafety

© 2017, 3M. All rights reserved.
3M is a trademark of 3M. Used under license in Canada.
34-8721-8852-8

Clean-Trace™ Test

Instructions relatives au produit

Test Surface Protein Allergen

Description et utilisation du produit

Le Test 3M™ Clean-Trace™ Surface Protein Allergen se sert de la réaction Biuret. Dans des conditions alcalines, les ions cuivre (Cu^{2+}) forment un complexe avec des liaisons peptidiques de protéines et se réduisent à Cu^+ . L'acide bicinchoninique (BCA) dans des conditions alcalines est un réactif hautement sensible, stable et spécifique qui forme un complexe pourpre en présence de Cu^+ . Ce test évalue la présence de protéines par un changement de couleur. Le Test 3M Clean-Trace Protein Allergen est un écouvillon de détection des protéines sensibles, avec un seuil de détection d'environ 3 µg des protéines totales (avec l'albumine sérique bovine comme témoin). Le seuil absolu varie avec la composition protéique des échantillons testés. Lors du test des surfaces, du matériel et des solutions de rinçage, il est important de noter qu'un résidu peut contenir un mélange de protéines allergisantes et non allergisantes, ainsi que des matières non protéiques.

Afin de fournir des conseils sur l'interprétation des résultats, des tests effectués par 3M ont montré qu'un résultat positif au Test 3M Clean-Trace Protein Allergen peut correspondre à la présence de quantités minimales approximatives des produits allergisants suivants :

Produit de référence

Limite de détection de l'allergène	Produit utilisé	Teneur en protéine (en %)
Oeuf 10-20 µg	NIST SRM8415 Poudre d'œuf entier	30
Lait 10-20 µg	NIST SRM8435 Poudre de lait entier	25,9
Cacahuète 25-50 µg	NIST SRM2387 Beurre de cacahuète	22,2
Gluten 40 µg	Farine de gluten (source locale)	~83
Soja 20-40 µg	Farine de soja (source locale)	~46,5
Amande 20-40 µg	Amande entière (source locale)	~19,5
Sarrasin 20-40 µg	Farine de sarrasin (source locale)	~13

Le Test 3M Clean-Trace Protein Allergen peut servir à détecter des résidus protéiques sur des surfaces et dans des solutions et déterminer ainsi si le nettoyage a éliminé efficacement les protéines, y compris les protéines potentiellement allergisantes. Cependant, l'interprétation des résultats varie en fonction de l'application spécifique, il est donc recommandé aux utilisateurs de valider la méthode pour leurs besoins spécifiques.

⚠ Avertissements

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations supplémentaires et connaître la réglementation locale relative à la mise au rebut.






⚠ Mises en garde

Les protéines sont des substances courantes. Elles sont présentes sur la peau, les poils, les cheveux et sur de nombreuses surfaces. Ne pas toucher l'écouvillon ou la surface à tester.

Ne pas utiliser le Test 3M Clean-Trace Protein Allergen après sa date de péremption.

Le Test 3M Clean-Trace Protein Allergen détecte les protéines et ne détecte donc pas les résidus de produits contenant peu ou pas de protéines.

Bien que le Test 3M Clean-Trace Protein Allergen soit très sensible, une surface ne peut pas être considérée comme stérile en fonction de son résultat.





La plupart des désinfectants courants à des concentrations normales produisent une interférence minimale. Toutefois, des concentrations élevées de nettoyants alcalins peuvent provoquer des résultats faussement négatifs dans certains cas. Les désinfectants à base de peroxyde peuvent provoquer un changement de couleur faussement positif du Test 3M Clean-Trace Protein Allergen.

Responsabilité de l'utilisateur

Il incombe aux clients et aux utilisateurs de connaître les instructions et les informations. Veuillez visiter notre site www.3M.com/foodsafety pour consulter les instructions les plus récentes ou contacter votre représentant ou distributeur 3M.

Lors du choix d'une méthode de test, il est important d'admettre que des facteurs externes comme les méthodes d'échantillonnage, les protocoles de test, la préparation des échantillons, la manipulation et les techniques de laboratoires peuvent influencer les résultats.

Il incombe à l'utilisateur de sélectionner une méthode d'analyse pour évaluer un nombre suffisant d'échantillons avec les matrices et les épreuves microbiennes appropriées afin de garantir que la méthode d'analyse répond aux critères de l'utilisateur.

Il incombe également à l'utilisateur de déterminer si une méthode d'analyse et ses résultats répondent aux exigences de ses clients ou fournisseurs.

Comme avec n'importe quelle méthode de test, les résultats obtenus avec ce produit ne constituent pas une garantie de la qualité des matrices ou des processus testés.

Limitation de garantie/Limites de recours

SAUF SI EXPRESSÉMENT ÉTABLI DANS LA SECTION DE GARANTIE LIMITÉE D'UN EMBALLAGE DE PRODUIT INDIVIDUEL, 3M RENONCE À TOUTE GARANTIE EXPLICITE ET IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION POUR UN USAGE SPÉCIFIQUE. En cas de défaut de tout produit de Sécurité Alimentaire 3M, 3M ou son distributeur agréé s'engage, à son entière discréction, au remplacement ou au remboursement du prix d'achat du produit. Il s'agit de vos recours exclusifs. Tout défaut supposé du produit devra être notifié à 3M dans un délai de soixante jours et le produit renvoyé au fournisseur. Veuillez appeler le Service clientèle (1-800-328-1671 aux États-Unis) ou votre représentant 3M en produits de microbiologie pour obtenir une autorisation de renvoi.

Limitation de responsabilité de 3M

3M NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DES PERTES OU DES DOMMAGES ÉVENTUELS, QU'ils SOIENT DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIFIQUES, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES PERTES DE PROFITS. En aucun cas et en aucune manière, la responsabilité de 3M ne sera engagée au-delà du prix d'achat du produit prétendu défectueux.

Conservation et élimination des déchets

Pour une durée de vie maximale, conserver le produit entre 2 et 25 °C. Autrement, les écouvillons restent stables pendant 14 jours lorsqu'ils sont expédiés ou stockés à température élevée ; pour cette option de stockage, ne pas dépasser 35 °C. La date d'expiration et le numéro de lot figurent sur chaque sachet. Peut contenir des microorganismes présentant un potentiel risque biologique après utilisation. Respecter les normes en vigueur concernant l'élimination des déchets.

Instructions d'utilisation

Avant de commencer la procédure de test, vérifier que le bain sec, le bain-marie ou l'incubateur est allumé et réglé à 55 °C.

1. Laisser le Test 3M Clean-Trace Protein Allergen à température ambiante pendant au moins 10 minutes avant utilisation. Saisir la poignée du bâtonnet de prélèvement et retirer l'écouillon du dispositif. Sur les surfaces sèches, utiliser l'hydratant fourni et appliquer 4 gouttes sur l'écouillon OU appliquer 4 gouttes sur la surface à tester [figure 1].
2. Écouvillonner la zone de test. Lorsque cela est possible, écouvillonner une zone d'environ 10 cm par 10 cm dans une seule direction, puis écouvillonner à nouveau dans la direction opposée [figure 2]. Appliquer une certaine pression sur l'écouillon et faire pivoter ce dernier une fois l'échantillon collecté afin de s'assurer que l'échantillon est reproductible et efficace [figure 3]. Pour tester une solution, plonger l'écouillon dans l'échantillon et retirer tout excès de liquide sur le côté du récipient.

Remarque : lors de tests de vérification de la présence d'agent désinfectant (par exemple vérification du pH), utiliser des échantillons liquides si une solution est testée.



3. Réinsérer le bâtonnet de prélèvement dans le test avec la poignée dans sa position initiale avant utilisation. À ce stade, vous pouvez soit activer le test et le lire immédiatement, soit, si vous préférez, étiqueter le Test 3M Clean-Trace Protein Allergen et le laisser non activé jusqu'à quatre heures avant de procéder à l'activation et à la lecture de plusieurs écouvillons en même temps.
4. Pour traiter l'échantillon, appuyer fermement sur le dessus de la poignée du bâtonnet de prélèvement du Test 3M Clean-Trace Protein Allergen [figure 4]. La poignée glissera dans le tube du dispositif. Le dessus de la poignée doit être au niveau du haut du tube du dispositif lorsque ce dernier est complètement enfoncé. Saisir le dessus du dispositif et secouer rapidement de gauche à droite pendant au moins cinq secondes pour mélanger l'échantillon et le réactif [figure 5]. La solution deviendra vert menthe.
5. Mettre le Test 3M Clean-Trace Protein Allergen dans un bloc chauffant préchauffé à 55 °C. Chauffer pendant 15 minutes à 55 °C. Comparer la couleur de l'écouvillon et de la solution à l'étiquette du Test 3M Clean-Trace Protein Allergen. Consigner comme résultat final le changement de couleur le plus fort de l'écouvillon ou de la solution.

Comment utiliser le Test 3M Clean-Trace Surface Protein Allergen de façon optimale	
Ce qu'il faut faire :	Ce qu'il ne faut pas faire :
Tenir le Test 3M Clean-Trace Protein Allergen en position VERTICALE lors de l'activation et secouer rapidement DE GAUCHE À DROITE pendant au moins 5 secondes.	Lancer l'activation lorsque le dispositif n'est pas en position verticale, ne pas secouer de haut en bas, ne pas secouer trop fort.
Incuber le Test 3M Clean-Trace Protein Allergen en position verticale.	Incuber le Test 3M Clean-Trace Protein Allergen en position horizontale.
Lire le Test 3M Clean-Trace Protein Allergen après 15 minutes.	Consigner tout changement de couleur après 15 minutes.

Interprétation

La couleur de la réaction au test indique la quantité de résidus protéiques sur la surface. La comparaison de la couleur obtenue à l'étiquette du Test 3M Clean-Trace Protein Allergen permet d'évaluer la propreté de la surface.

- Vert indique un résultat de « réussite » ; propre, aucune autre mesure nécessaire.
- Gris est non concluant ; il est recommandé de nettoyer à nouveau et de procéder à un nouveau test.
- Violet indique un résultat d'« échec » ; il convient de nettoyer à nouveau et de procéder à un nouveau test.

En chauffant, la couleur vert menthe s'estompe et s'éclaircit en prenant une teinte bleue pour les échantillons négatifs ; la couleur verte revient lors du refroidissement peu après le retrait du bloc chauffant. Pour faciliter l'interprétation, il est recommandé d'effectuer une comparaison avec un témoin négatif.

Pour de plus amples informations, contacter les Services techniques de Sécurité Alimentaire 3M.

Explication des symboles

www.3M.com/foodsafety/symbols

3M Food Safety

3M United States

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-800-328-6553

3M Canada

Post Office Box 5757
London, Ontario N6A 4T1
Canada
1-800-563-2921

3M Latin America

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-954-340-8263

3M Europe and MEA

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Strasse 1
D41453 Neuss/Germany
+49-2131-14-3000

3M United Kingdom PLC

Morley Street, Loughborough
Leicestershire
LE11 1EP
United Kingdom
+(44) 1509 611 611

3M Österreich GmbH

Euro Plaza
Gebaude J, A-1120 Wien
Kranichberggasse 4
Austria
+(43) 1 86 686-0

3M Asia Pacific

No 1, Yishun Avenue 7
Singapore, 768923
65-64508869

3M Japan

3M Health Care Limited
6-7-29, Kita-Shinagawa
Shinagawa-ku, Tokyo
141-8684 Japan
81-570-011-321

3M Australia

Bldg A, 1 Rivett Road
North Ryde, NSW 2113
Australia
611300 363 878



3M Health Care

2510 Conway Ave
St. Paul, MN 55144 USA
www.3M.com/foodsafety

© 2017, 3M. All rights reserved.
3M is a trademark of 3M. Used under license in Canada.
34-8721-8852-8

Clean-Trace™

Gebrauchsanweisungen

Oberflächen Protein Allergen Test

Produktbeschreibung und Verwendungszweck

Der 3M™ Clean-Trace™ Oberflächen Protein Allergen Test basiert auf der Biuret-Reaktion. Unter alkalischen Bedingungen bilden die Kupferionen (Cu^{2+}) einen Komplex mit Peptidbindungen des Proteins und werden zu Cu^+ reduziert. Bicinchoninsäure (BCA) ist unter alkalischen Bedingungen ein hochempfindliches, stabiles und spezifisches Reagens für Cu^+ , das einen violetten Komplex bildet. Durch die Farbänderung ermöglicht der Test eine Abschätzung der Proteinkonzentration. Der 3M Clean-Trace Protein Allergen Test ist ein empfindlicher Abstrich zum Proteinnachweis mit einer Nachweisgrenze von etwa 3 µg Gesamtprotein (unter Verwendung von Rinderserumalbumin als Kontrollwert). Die absolute Grenze hängt von Proteinzusammensetzung der getesteten Proben ab. Beim Testen von Oberflächen, Gerätschaften und Spülösungen muss beachtet werden, dass Rückstände aus einer Mischung von allergenen und nicht-allergenen Proteinen sowie Nicht-Proteinen bestehen kann.

Hinweise zur Interpretation der Ergebnisse: Tests bei 3M haben gezeigt, dass ein positiver 3M Clean-Trace Protein Allergen Test das Vorhandensein der folgenden ungefähren Mindestmengen an allergenen Produkten bedeuten könnte:

Referenzmaterial

Allergennachweisgrenze	Verwendete Substanz	Proteingehalt (%)
Ei 10-20 µg	NIST SRM8415 Volleipulver	30
Milch 10-20 µg	NIST SRM8435 Vollmilchpulver	25,9
Erdnuss 25-50 µg	NIST SRM2387 Erdnussbutter	22,2
Gluten 40 µg	Glutenhaltiges Mehl (lokal produziert)	~83
Soja 20-40 µg	Sojamehl (lokal produziert)	~46,5
Mandel 20-40 µg	Ganze Mandel (lokal produziert)	~19,5
Buchweizen 20-40 µg	Buchweizenmehl (lokal produziert)	~13

Der 3M Clean-Trace Protein Allergen Test kann verwendet werden, um Proteinrückstände auf Oberflächen und in Lösungen nachzuweisen und dadurch zu bestimmen, ob die Reinigung zur Entfernung von Proteinen, einschließlich potentiell allergener Proteine, wirksam war. Die Interpretation der Ergebnisse variiert jedoch je nach Anwendung, daher wird empfohlen, dass die Benutzer die Methode für ihre spezifischen Anforderungen validieren.

⚠ Warnhinweise

Weitere Informationen sowie die jeweils vor Ort geltenden Richtlinien zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.






⚠ Vorsichtshinweise

Protein ist eine häufig auftretende Substanz. Es ist auf Haut, Haar und zahlreichen Oberflächen vorhanden. Berühren Sie nicht den Tupfer oder die zu testende Oberfläche.

Verwenden Sie den 3M Clean-Trace Protein Allergen Test nicht nach Ablauf des Verfalldatums.

Der 3M Clean-Trace Protein Allergen Test erkennt Proteine und keine Rückstände von Produkten mit wenig oder gar keinem Protein.

Obwohl der 3M Clean-Trace Protein Allergen Test äußerst empfindlich ist, kann eine Oberfläche nicht anhand des Ergebnisses eines 3M Clean-Trace Protein Allergen Tests als steril eingestuft werden.





Bei einer normalen Konzentration gibt es mit den meisten üblichen Desinfektionsmitteln nur minimale Interferenzen. Eine hohe Konzentration alkalischer Reiniger kann jedoch in einigen Fällen zu falsch negativen Ergebnissen führen. Desinfektionsmittel auf Peroxidbasis können beim 3M Clean-Trace Protein Allergen Test eine falsch positive Farbänderung verursachen.

Verantwortung des Anwenders

Anwender müssen sich auf eigene Verantwortung mit den Gebrauchsanweisungen und Informationen des Produkts vertraut machen. Für weitere Informationen, besuchen Sie unsere Website unter www.3M.com/foodsafety oder wenden Sie sich an Ihren lokalen 3M Verkaufsvertreter oder Händler.

Bei der Auswahl einer Testmethode ist zu beachten, dass externe Faktoren wie Probennahme, Testprotokoll, Probenaufbereitung, Handhabung und Labortechnik die Ergebnisse beeinflussen können.

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders bei der Auswahl einer Testmethode oder eines Produkts, diese mit einer ausreichenden Anzahl von Proben und Kontrollen zu evaluieren, um sicherzustellen, dass die gewählte Testmethode seinen Anforderungen entspricht.

Der Anwender trägt ebenfalls die Verantwortung dafür, dass die angewendeten Testmethoden und Ergebnisse den Anforderungen seiner Kunden und Lieferanten entsprechen.

Wie bei allen Testmethoden, stellen die mit 3M Lebensmittelsicherheitsprodukten erhaltenen Ergebnisse keine Garantie für die Qualität der untersuchten Matrizen oder Prozesse dar.

Haftungsbeschränkungen / Beschränkte Rechtsmittel

AUSSER ES WIRD AUSDRÜCKLICH ANDERS IM ABSCHNITT DER HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN DER VERPACKUNG DES JEWELIGEN PRODUKTS ANGEgeben, LEHNT 3M ALLE AUSDRÜCKLICHEN UND STILLSCHWEIGENDEN GARANTien, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKt AUF, DIE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AB.

Sollte sich ein 3M Lebensmittelsicherheitsprodukt als defekt herausstellen, wird es von 3M oder einem autorisierten Vertragshändler, nach eigenem Ermessen ersetzt oder der Kaufpreis zurückerstattet. Gewährleistungsansprüche bestehen nicht. Sie sind verpflichtet, 3M umgehend innerhalb von sechzig Tagen, nachdem die mutmaßlichen Defekte am Produkt festgestellt wurden, davon zu informieren und das Produkt an 3M zurückzusenden. Bitte rufen Sie zwecks „Verfahren der Warenrückgabe“ den Kundendienst (1-800-328-1671 in den USA) oder Ihren autorisierten Vertreter für 3M Lebensmittelsicherheitsprodukte an.

Haftungsbeschränkungen

3M HAFtet NICHT FÜR VERLUSTE ODER SCHÄDEN, GANZ GLEICH OB MITTELBARE, UNMITTELBARE, SPEZIELLE, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BESCHRÄNKt AUF ENTGANGENEN GEWINN. In keinem Fall übersteigt die Haftung der 3M den Kaufpreis des angeblich defekten Produkts.

Lagerung und Entsorgung

Für maximale Haltbarkeit zwischen 2 und 25°C lagern. Alternativ sind die Tupfer 14 Tage lang stabil, wenn sie bei erhöhter Temperatur (nicht höher als 35°C) transportiert oder gelagert werden. Verfallsdatum und Chargennummer sind auf jedem Beutel aufgedruckt. Kann nach der Anwendung Mikroorganismen enthalten, die eine mögliche Biogefährdung darstellen. Bei der Entsorgung der Platten sind die jeweils gültigen Industriestandards zu beachten.

Bedienungsanleitung

Schalten Sie vor Beginn des Tests das Trockenbad, das Wasserbad oder den Inkubator ein und wählen Sie eine Temperatur von 55°C.

1. Lagern Sie den 3M Clean-Trace Protein Allergen Test vor Gebrauch für mindestens 10 Minuten bei Raumtemperatur. Greifen Sie den Griff des Probensammelstabs und entnehmen Sie den Tupfer aus dem Testgerät. Verwenden Sie auf trockenen Oberflächen das mitgelieferte Befeuchtungsmittel und geben Sie 4 Tropfen auf den Tupfer ODER geben Sie 4 Tropfen auf die zu testende Oberfläche [Abbildung 1].
2. Wischen Sie mit dem Tupfer über die Testfläche. Wenn möglich wischen Sie eine Fläche von 10 × 10 cm mit dem Tupfer ab, reiben Sie die Fläche zunächst in eine Richtung und anschließend in die entgegengesetzte Richtung ab [Abbildung 2]. Wenden Sie Druck auf den Tupfer an und drehen Sie den Tupfer bei der Entnahme der Probe, um eine reproduzierbare und effektive Probenentnahme zu gewährleisten [Abbildung 3]. Um eine Lösung zu testen, tauchen Sie den Tupfer in die Probe und entfernen Sie überschüssige Flüssigkeit an der Seite des Gefäßes.

Hinweis: Prüfen Sie zunächst die Anwesenheit von Desinfektionsmittel (z. B. pH-Kontrolle) in flüssigen Proben, wenn eine Lösung getestet wird.

3. Stecken Sie den Probensammelstab wieder in das Testgerät, wobei der Griff in seine ursprüngliche Position wie im unbenutzten Testgerät eingeführt wird. An diesem Punkt können Sie den Test sofort aktivieren und ablesen oder, wenn dies praktischer ist, erst den 3M Clean-Trace Protein Allergen Test beschriften. Der Test kann bis zu vier Stunden unaktiviert bleiben, sodass mehrere Tupfer gleichzeitig aktiviert und abgelesen werden können.
4. Zur Bearbeitung der Probe fest auf die Oberseite des Griffes des 3M Clean-Trace Protein Allergen Test Probensammelstabs drücken [Abbildung 4]. Der Griff gleitet in das Rohr des Testgeräts und die Oberseite des Griffes sollte sich auf einer Ebene mit der Oberseite des Testgeräterohrs befinden, wenn der Griff vollständig heruntergedrückt ist. Greifen Sie die Oberseite des Geräts und schütteln Sie das Gerät mindestens fünf Sekunden lang von Seite zu Seite, um Probe und Reagenz zu vermischen [Abbildung 5]. Die Lösung färbt sich mintgrün.
5. Platzieren Sie den 3M Clean-Trace Protein Allergen Test in einem auf 55°C vorgeheizten Heizblock. Erwärmen Sie den Test für 15 Minuten bei 55°C. Vergleichen Sie die Farbe des Tupfers und der Lösung mit der Farbkarte auf dem Etikett des 3M Clean-Trace Protein Allergen Tests. Notieren Sie die stärkste Farbänderung am Tupfer oder in der Lösung als Endergebnis.

Anwendung des 3M Clean-Trace Protein Allergen Tests	
Unbedingt beachten	Unbedingt vermeiden
Halten Sie den 3M Clean-Trace Protein Allergen Test bei Aktivierung VERTIKAL und schütteln Sie ihn für mindestens 5 Sekunden schnell von SEITE ZU SEITE.	Aktivieren, wenn sich das Gerät nicht in vertikaler Position befindet; von oben nach unten schütteln; kräftig schütteln.
Inkubieren Sie den 3M Clean-Trace Protein Allergen Test vertikal.	Den 3M Clean-Trace Oberflächen Protein Allergen Test horizontal inkubieren.
Lesen Sie den 3M Clean-Trace Protein Allergen Test nach genau 15 Minuten ab.	Dokumentieren einer Farbänderung nach Ablauf von 15 Minuten.

Interpretation

Die Farbe der Testreaktion zeigt die Menge an Proteinrückständen auf der Oberfläche an. Durch Vergleich der erzeugten Farbe mit dem Etikett des 3M Clean-Trace Protein Allergen Tests kann eine Abschätzung der Oberflächenreinheit vorgenommen werden.

- Grün = Bestanden: Oberfläche ist sauber, keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
- Grau = Nicht eindeutig: Oberfläche erneut reinigen und Test wiederholen.
- Violett = Nicht bestanden: Oberfläche erneut reinigen und Test wiederholen

Beim Erhitzen verblasst die mintgrüne Farbe und wird bei negativen Proben klar mit einem leichten blauen Einfärbung. Die mintgrüne Farbe kehrt beim Abkühlen kurz nach dem Entfernen aus dem Heizblock zurück. Um die Interpretation zu erleichtern, wird ein Vergleich mit einer Negativkontrolle empfohlen.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Technischen Kundendienst von 3M Food Safety.

Erklärung der Symbole

www.3M.com/foodsafety/symbols

3M Food Safety

3M United States

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-800-328-6553

3M Canada

Post Office Box 5757
London, Ontario N6A 4T1
Canada
1-800-563-2921

3M Latin America

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-954-340-8263

3M Europe and MEA

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Strasse 1
D41453 Neuss/Germany
+49-2131-14-3000

3M United Kingdom PLC

Morley Street, Loughborough
Leicestershire
LE11 1EP
United Kingdom
+(44) 1509 611 611

3M Österreich GmbH

Euro Plaza
Gebaude J, A-1120 Wien
Kranichberggasse 4
Austria
+(43) 1 86 686-0

3M Asia Pacific

No 1, Yishun Avenue 7
Singapore, 768923
65-64508869

3M Japan

3M Health Care Limited
6-7-29, Kita-Shinagawa
Shinagawa-ku, Tokyo
141-8684 Japan
81-570-011-321

3M Australia

Bldg A, 1 Rivett Road
North Ryde, NSW 2113
Australia
611300 363 878



3M Health Care

2510 Conway Ave
St. Paul, MN 55144 USA
www.3M.com/foodsafety

© 2017, 3M. All rights reserved.
3M is a trademark of 3M. Used under license in Canada.
34-8721-8852-8



Clean-Trace™

Istruzioni sul prodotto

Test Surface Protein Allergen

Descrizione del prodotto e uso previsto

Il Test 3M™ Clean-Trace™ Surface Protein Allergen si basa sulla reazione del biureto. In condizioni alcaline gli ioni di rame (Cu^{2+}) formano un complesso con i legami peptidici delle proteine e vengono ridotti a Cu^+ . L'acido bicinconinico (BCA) in condizioni alcaline è un reagente estremamente sensibile, stabile e specifico che forma un complesso viola con Cu^+ . Il test fornisce una stima delle proteine mediante un cambiamento di colore. Il test 3M Clean-Trace Protein Allergen è un tampone di rilevamento delle proteine sensibile, caratterizzato da un limite di rilevamento di circa 3 µg delle proteine totali (con albumina sierica di origine bovina come controllo). Il limite assoluto varierà al variare della composizione in proteine dei campioni sottoposti ad analisi. Quando si analizzano superfici, apparecchiature e soluzioni di risciacquo, è importante osservare che un residuo può contenere una miscela di proteine allergeniche e non allergeniche, oltre a materiale non proteico.

Per fornire alcune indicazioni sull'interpretazione dei risultati, le analisi in 3M hanno mostrato che un risultato del test 3M Clean-Trace Protein Allergen può indicare la presenza delle seguenti quantità minime approssimative di prodotti allergenici:

Materiale di riferimento

Limite di rilevamento degli allergeni	Materiale utilizzato	Contenuto in proteine (%)
Uovo 10-20 µg	NIST SRM8415 Uova intere in polvere	30
Latte 10-20 µg	NIST SRM8435 Latte intero in polvere	25,9
Arachidi 25-50 µg	NIST SRM2387 Burro di arachidi	22,2
Glutine 40 µg	Farina contenente glutine (di provenienza locale)	~83
Soia 20-40 µg	Farina di soia (di provenienza locale)	~46,5
Mandorla 20-40 µg	Mandorla intera (di provenienza locale)	~19,5
Grano saraceno 20-40 µg	Farina di grano saraceno (di provenienza locale)	~13

Il test 3M Clean-Trace Protein Allergen può essere utilizzato per individuare i residui di proteine sulle superfici e nelle soluzioni e quindi determinare se la pulizia è stata efficace nell'eliminare le proteine, incluse quelle potenzialmente allergeniche. Comunque, l'interpretazione dei risultati varia, a seconda della specifica applicazione, quindi si raccomanda agli utenti di convalidare il metodo per i loro requisiti specifici.

⚠️ Avvertenze

Per ulteriori informazioni, consultare la Scheda di sicurezza dei materiali e le normative locali per lo smaltimento.






⚠️ Precauzioni

Le proteine sono sostanze comuni. Sono presenti su pelle, capelli e molte superfici. Non toccare il tampone né la superficie da analizzare.

Non utilizzare il test 3M Clean-Trace Protein Allergen dopo la data di scadenza.

Il test 3M Clean-Trace Protein Allergen rileva le proteine e quindi non rileverà i residui di prodotti con presenza di proteine bassa o nulla.

Nonostante il test 3M Clean-Trace Protein Allergen sia molto sensibile, una superficie non può essere considerata priva di allergeni sulla base dei risultati di un test effettuato con 3M Clean-Trace Protein Allergen.



L'interferenza con i comuni disinfettanti in concentrazioni normali è minima. Comunque, elevate concentrazioni di detergenti alcalini possono provocare, in alcuni casi, risultati falsi positivi. I disinfettanti a base di perossido possono provocare una reazione di modifica del colore falsa positiva con il test 3M Clean-Trace Protein Allergen.

Responsabilità Dell'Utente

Gli utenti sono tenuti a leggere e apprendere le istruzioni e le informazioni relative al prodotto. Visitare il nostro sito web all'indirizzo www.3M.com/foodsafety, oppure contattare il distributore locale o rappresentante commerciale 3M per ulteriori informazioni.

Nella scelta di un metodo di test, è importante tener conto del fatto che fattori esterni quali i metodi di campionamento, i protocolli di test, la preparazione del campione, la manipolazione e le tecniche di laboratorio possono influenzare i risultati.

È responsabilità dell'utente, nel selezionare un qualsiasi metodo di analisi o prodotto, valutare un numero sufficiente di campioni con le matrici appropriate e con particolari caratteristiche microbiche per soddisfare i criteri relativi alla metodologia di test scelta dall'utente.

L'utente ha inoltre la responsabilità di determinare che tutti i metodi di analisi utilizzati e i risultati ottenuti soddisfino i requisiti dei propri clienti o fornitori.

Come per qualsiasi metodo di analisi, i risultati ottenuti grazie all'uso di prodotti di 3M Sicurezza alimentare non costituiscono una garanzia della qualità delle matrici o dei processi sottoposti a prova.

Limitazione di Garanzia/Rimedio Limitato

SALVO NEI CASI ESPRESSAMENTE INDICATI IN UNA SEZIONE DI GARANZIA LIMITATA DELLA SINGOLA CONFEZIONE DEL PRODOTTO, 3M NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON A ESSE LIMITATE, LE EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIALIBITÀ O DI IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. Qualora un prodotto 3M Sicurezza alimentare sia difettoso, 3M o il suo distributore autorizzato provvederanno, a loro discrezione, alla sostituzione o al rimborso del prezzo d'acquisto del prodotto. Questi sono gli unici rimedi a disposizione del cliente. Si dovrà avvisare immediatamente 3M entro sessanta giorni dal riscontro di eventuali difetti sospetti nel prodotto, provvedendo a rispedirlo a 3M. Chiamare il servizio clienti (negli USA: 1-800-328-1671) o rivolgersi al rappresentante autorizzato dei prodotti Sicurezza alimentare 3M per ottenere l'autorizzazione alla restituzione del prodotto.

Limitazione di Responsabilità da Parte di 3M

3M NON SARÀ RESPONSABILE DI PERDITE O DANNI, DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEGUENTI, INCLUSA, MA NON IN VIA LIMITATIVA, LA PERDITA DI PROFITTO. In nessun caso la responsabilità legale di 3M andrà oltre il prezzo d'acquisto del prodotto presunto difettoso.

Conservazione e smaltimento

Per la massima durata su scaffale, conservare a una temperatura compresa tra 2 e 25 °C (36-77 °F). In alternativa, i tamponi sono stabili per 14 giorni quando vengono spediti e conservati a temperatura elevata; per questa opzione di conservazione, non superare i 35 °C (95 °F). La data di scadenza e il numero di lotto sono indicati su ogni singola busta. Dopo l'uso, può contenere microorganismi che possono rappresentare un potenziale rischio biologico. Seguire le normative vigenti del settore per lo smaltimento.

Istruzioni per l'uso

Prima di iniziare la procedura di analisi, accertarsi che il bagno secco, il bagno ad acqua o l'incubatore siano accesi e impostati su 55 °C (131 °F).

1. Lasciare il test 3M Clean-Trace Protein Allergen a temperatura ambiente per almeno 10 minuti prima di utilizzarlo. Afferrare l'impugnatura del bastoncino di campionamento ed estrarre il tampone dal dispositivo. Su superfici asciutte, utilizzare l'agente idratante fornito e applicarne 4 gocce al tampone OPPURE applicarne 4 gocce alla superficie da analizzare [figura 1].
2. Strofinare il tampone sull'area da analizzare. Quando possibile, strofinare il tampone su un'area di circa 10 cm x 10 cm, prima in una direzione e poi nella direzione opposta [figura 2]. Mentre si preleva il campione, applicare pressione sul tampone e ruotarlo, per assicurarsi che il campionamento sia efficace e ripetibile [figura 3]. Per analizzare una soluzione, immergere il tampone nel campione e rimuovere ogni liquido in eccesso sul lato del recipiente.

Nota: se si analizza una soluzione, analizzare per verificare se sono presenti agenti disinfettanti (ad es. controllo del pH) nei campioni di liquido.

3. Reinserire il bastoncino di campionamento nel test riportando l'impugnatura alla posizione che aveva prima dell'uso. A questo punto, è possibile attivare e leggere immediatamente oppure, se è più comodo, il test 3M Clean-Trace Protein Allergen può essere etichettato e lasciato inattivato per un tempo massimo di quattro ore prima dell'attivazione e della misurazione di più tamponi simultaneamente.
4. Per attivare il campione, spingere con decisione sulla sommità dell'impugnatura del bastoncino di campionamento del test 3M Clean-Trace Protein Allergen [figura 4]. Spingere a fondo, in modo che l'impugnatura entri nella provetta del dispositivo per il test e la sua sommità sia a filo della sommità della provetta stessa quando è completamente premuta. Afferrare il dispositivo dalla sommità e scuotere rapidamente da un lato all'altro per almeno cinque secondi, in modo da miscelare il campione e il reagente [figura 5]. La soluzione diventerà verde menta.
5. Lasciare il test 3M Clean-Trace Protein Allergen in un blocco di riscaldamento pre-riscaldato a 55 °C (131 °F). Riscaldare per 15 minuti a 55 °C (131 °F). Confrontare il colore del tampone e della soluzione con l'etichetta del test 3M Clean-Trace Protein Allergen. Registrare il cambiamento di colore più forte sul tampone o nella soluzione come risultato finale.

Come utilizzare al meglio il Test Surface Protein Allergen 3M Clean-Trace	
Da fare	Da non fare
All'attivazione, tenere il test 3M Clean-Trace Protein Allergen in posizione VERTICALE e scuotere rapidamente DA UN LATO ALL'ALTRO per almeno 5 secondi.	Attivare il dispositivo non in posizione verticale, non scuotere su e giù né scuotere vigorosamente.
Incubare il test 3M Clean-Trace Protein Allergen in posizione verticale.	Incubare il test 3M Clean-Trace Protein Allergen in posizione orizzontale.
Leggere il test 3M Clean-Trace Protein Allergen dopo 15 minuti.	Registrare qualsiasi cambiamento di colore dopo 15 minuti.

Interpretazione

Il colore della reazione del test indicherà il livello di residui di proteine sulla superficie. Confrontando il colore prodotto con l'etichetta del test 3M Clean-Trace Protein Allergen si può fare una stima della pulizia della superficie.

- Verde indica un risultato di Test superato - Pulito, non è necessaria alcuna azione ulteriore.
- Grigio non è conclusivo – Si raccomanda di pulire nuovamente e rieseguire il test.
- Viola indica un risultato di Mancato superamento del test - Pulire nuovamente e rieseguire il test.

Scaldando il colore si sbiadisce e diventa più chiaro con una sfumatura blu per i campioni negativi; il colore verde torna raffreddando, subito dopo la rimozione dal blocco di riscaldamento. Per aiutare nell'interpretazione, si raccomanda il confronto con un controllo negativo.

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio tecnico di 3M Sicurezza alimentare.

Legenda dei simboli

www.3M.com/foodsafety/symbols

3M Food Safety

3M United States

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-800-328-6553

3M Canada

Post Office Box 5757
London, Ontario N6A 4T1
Canada
1-800-563-2921

3M Latin America

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-954-340-8263

3M Europe and MEA

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Strasse 1
D41453 Neuss/Germany
+49-2131-14-3000

3M United Kingdom PLC

Morley Street, Loughborough
Leicestershire
LE11 1EP
United Kingdom
+(44) 1509 611 611

3M Österreich GmbH

Euro Plaza
Gebaude J, A-1120 Wien
Kranichberggasse 4
Austria
+(43) 1 86 686-0

3M Asia Pacific

No 1, Yishun Avenue 7
Singapore, 768923
65-64508869

3M Japan

3M Health Care Limited
6-7-29, Kita-Shinagawa
Shinagawa-ku, Tokyo
141-8684 Japan
81-570-011-321

3M Australia

Bldg A, 1 Rivett Road
North Ryde, NSW 2113
Australia
611300 363 878



3M Health Care

2510 Conway Ave
St. Paul, MN 55144 USA
www.3M.com/foodsafety

© 2017, 3M. All rights reserved.
3M is a trademark of 3M. Used under license in Canada.
34-8721-8852-8



Clean-Trace™

(Español)



Fecha de emisión: 2017-10

Instrucciones del Producto

Test Proteínas Alergénicas en Superficie

Descripción del producto y uso previsto

La 3M™ Clean-Trace™ Test Proteínas Alergénicas en Superficie se basa en la reacción de Biuret. Bajo condiciones alcalinas, los iones cobre (Cu^{2+}) forman un complejo con enlaces peptídicos de proteína y se reducen a Cu^+ . El ácido bicinconílico (BCA) bajo condiciones alcalinas es altamente sensible, estable y un reactivo específico que forma un complejo púrpura con el Cu^+ . La prueba ofrece una estimación de proteína por medio del resultado en cambio de color. La 3M™ Clean-Trace™ Test Proteínas Alergénicas en Superficie consiste en un hisopado para la detección de proteína, con un límite de detección de aproximadamente 3 μg de la proteína total (usando albúmina de suero bovino como control). El límite absoluto puede variar con la composición proteica de las muestras analizadas. Cuando analice superficies, equipos y soluciones de enjuague, es importante tener en cuenta que un residuo puede contener una mezcla de proteínas alergénicas y no alergénicas, así como materiales no proteicos.

Para ofrecer cierta orientación en la interpretación de los resultados, las pruebas en 3M han demostrado que un resultado positivo en la 3M Clean-Trace Test Proteínas Alergénicas en Superficie puede ser equivalente a la presencia de las siguientes cantidades mínimas aproximadas de productos alergénicos:

Material de referencia

Límite de detección del alérgeno	Material usado	Contenido de proteína (%)
Huevo 10 μg -20 μg	NIST SRM8415 Polvo de huevo entero	30
Leche 10 μg -20 μg	NIST SRM8435 Polvo de leche entera	25,9
Maní 25 μg -50 μg	NIST SRM2387 Mantequilla de maní	22,2
Gluten 40 μg	Harina de gluten (abastecida localmente)	~83
Soja 20 μg -40 μg	Harina de soja (abastecida localmente)	~46,5
Almendra 20 μg -40 μg	Almendra entera (abastecida localmente)	~19,5
Trigo sarraceno 20 μg -40 μg	Harina trigo sarraceno (abastecida localmente)	~13

La 3M Clean-Trace Test Proteínas Alergénicas en Superficie se puede usar para detectar residuos de proteína sobre las superficies y en solución, y por tanto determinar si la limpieza ha sido efectiva para eliminar proteínas, incluso las que podrían ser alergénicas. Sin embargo, la interpretación de los resultados varía según la aplicación específica, por lo que se recomienda que los usuarios validen el método de sus requisitos específicos.

⚠ Advertencias






Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para obtener más información y conocer las normativas locales para el desecho de materiales.

⚠ Precauciones

La proteína es una sustancia común. Está presente en la piel, el vello y en muchas superficies. No toque el hisopo ni la superficie que se debe analizar.

No use la 3M Clean-Trace Test Proteínas Alergénicas en Superficie después de la fecha de vencimiento.

La 3M Clean-Trace Test Proteínas Alergénicas en Superficie detecta proteína, por lo que no detectará residuos de productos con bajo contenido o cero contenido de proteína.





Si bien la 3M Clean-Trace Test Proteínas Alergénicas en Superficie es muy sensible, una superficie no podrá considerarse libre de alérgenos en función de su resultado.

Existe una mínima interferencia con la mayoría de los desinfectantes en concentraciones normales. Sin embargo, las elevadas concentraciones de limpiadores alcalinos podrían provocar resultados falsos negativos en algunos casos. Los desinfectantes basados en peróxido pueden provocar una reacción de cambio de color falso positivo con la 3M Clean-Trace Test Proteínas Alergénicas en Superficie.

Responsabilidad del Usuario

Los usuarios son responsables de familiarizarse con las instrucciones e información del producto. Visite nuestro sitio web en www.3M.com/foodsafety o póngase en contacto con su representante o distribuidor local de 3M para obtener más información.

Al seleccionar un método de prueba, es importante reconocer que factores externos tales como los métodos de muestreo, los protocolos de prueba, la preparación de la muestra, la manipulación y la técnica de laboratorio pueden afectar los resultados.

Al seleccionar cualquier método de prueba o producto, es responsabilidad del usuario evaluar un número suficiente de muestras con retos microbianos y matrices apropiadas para satisfacer al usuario en cuanto a que el método de prueba cumple con los criterios necesarios.

Además, es responsabilidad del usuario determinar que cualquier método de prueba y sus resultados cumplen con los requisitos de sus clientes y proveedores.

Como sucede con cualquier método de prueba, los resultados obtenidos del uso de cualquier producto de 3M Food Safety no constituyen una garantía de calidad de las matrices ni de los procesos analizados.

Limitación de Garantías / Recurso Limitado

SALVO LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN UNA SECCIÓN DE GARANTÍA LIMITADA O EN EL EMBALAJE DE UN PRODUCTO ESPECÍFICO, 3M RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS Y TÁCITAS INCLUIDA, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN USO EN PARTICULAR. Si un producto de 3M Food Safety es defectuoso, 3M o su distribuidor autorizado reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra del producto, a su elección. Estos son sus recursos exclusivos. Deberá notificar inmediatamente a 3M en un lapso de sesenta días a partir del descubrimiento de cualquier sospecha de defecto en un producto y devolver dicho producto a 3M. Llame a Atención al Cliente (1-800-328-1671 en los EE. UU.) o a su representante oficial de 3M Food Safety para obtener una Autorización de devolución de productos.

Limitación de la Responsabilidad de 3M

3M NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO, YA SEA DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, DAÑOS ACCIDENTALES O CONSECUENCIAS, INCLUIDOS ENTRE OTROS, LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS. En ningún caso la responsabilidad de 3M conforme a ninguna teoría legal excederá el precio de compra del producto supuestamente defectuoso.

Almacenamiento y desecho

Para tener una máxima vida útil, almacene entre 2 °C y 25 °C (36 °F y 77 °F). Alternativamente, los hisopos son estables durante 14 días cuando se los envía o almacena a temperatura elevada; siempre que la opción de almacenamiento no exceda los 35 °C (95 °F). La fecha de vencimiento y el número de lote están impresos en cada bolsa. Una vez usados, pueden contener microorganismos que pueden representar un posible riesgo biológico. Siga las normas actuales de la industria para su desecho.

Instrucciones de uso

Antes de comenzar el procedimiento de prueba, asegúrese de que un baño seco, un baño de agua o incubadora estén encendidos y configurados en 55 °C (131 °F).

1. Coloque la 3M Clean-Trace Test Proteínas Alergénicas en Superficie a temperatura ambiente durante al menos 10 minutos antes de usarla. Agarre el mango del palillo de muestra y quite el hisopo del instrumento. Sobre las superficies secas, use el humectante provisto y aplique 4 gotas sobre el hisopo O aplique 4 gotas sobre la superficie a analizar [Figura 1].



2. Limpie con el hisopo el área de prueba. Cuando sea conveniente, limpie un área de aproximadamente 10 cm x 10 cm con el hisopo, primero en una dirección y luego en la dirección contraria [Figura 2]. Aplique presión en el hisopo y gírelo a medida que recolecte la muestra para asegurarse de obtener una muestra repetible y eficaz [Figura 3]. Para evaluar una solución, sumerja el hisopo en la muestra y retire cualquier exceso de líquido contra el borde del recipiente.

Nota: analice la presencia del agente sanitizante (por ejemplo, una comprobación de pH) en muestras de líquido si se evalúa una solución.

3. Reinserte la varilla de muestra en la prueba con el mango colocado en la posición original de la prueba sin usar. En este punto, puede activarlo o medirlo inmediatamente, o, si fuera más conveniente, se puede etiquetar la 3M Clean-Trace Test Proteínas Alergénicas en Superficie y dejarla sin activar durante hasta cuatro horas antes de la activación y medición de varios hisopos en simultáneo.
4. Para procesar la muestra, presione firmemente hacia abajo la parte superior del mango del palillo de muestra de la 3M Clean-Trace Test Proteínas Alergénicas en Superficie [Figura 4]. El mango se deslizará dentro del tubo del instrumento y la parte superior del mango deberá estar nivelada con la parte superior de este tubo cuando esté completamente presionado. Agarre la parte superior del instrumento y agítelo rápidamente de lado a lado durante por lo menos cinco segundos para mezclar la muestra y el reactivo [Figura 5]. La solución tomará un color verde menta.
5. Coloque la 3M Clean-Trace Test Proteínas Alergénicas en Superficie en un bloque de calentamiento que se haya precalentado hasta 55 °C (131 °F). Caliente durante 15 minutos a 55 °C (131 °F). Compare el color del hisopo y la solución con la etiqueta de la 3M Clean-Trace Test Proteínas Alergénicas en Superficie. Registre el cambio de color más fuerte sobre en la solución o en el hisopo como resultado final.

Cuál es la mejor forma de usar la 3M Clean-Trace Test Proteínas Alergénicas en Superficie	
Correcto	Incorrecto
Mantenga la 3M Clean-Trace Test Proteínas Alergénicas en Superficie en posición VERTICAL durante la activación y agítela rápidamente de LADO A LADO durante al menos 5 segundos.	Active el instrumento de prueba cuando no está en posición vertical, no lo agite hacia arriba y abajo, ni lo agite vigorosamente.
Incube la 3M Clean-Trace Test Proteínas Alergénicas en Superficie en posición vertical.	Incube la 3M Clean-Trace Test Proteínas Alergénicas en Superficie en posición horizontal.
Lea la 3M Clean-Trace Test Proteínas Alergénicas en Superficie a los 15 minutos.	Registre cualquier cambio de color después de 15 minutos.

Interpretación

El color de la reacción de prueba indicará el nivel de residuos de proteína sobre la superficie. Al comparar el color producido con la etiqueta de la 3M Clean-Trace Test Proteínas Alergénicas en Superficie se puede hacer una estimación de la limpieza de la superficie.

- El verde indica un resultado de Aprobado: limpio, no se requiere otra acción.
- El gris no es concluyente: se recomienda repetir la limpieza y la prueba.
- El púrpura indica un resultado Fallido: repita la limpieza y la prueba.

Ante el calentamiento, el color verde se disipa y se vuelve transparente con un tinte azulado para las muestras negativas; el color verde vuelve tras el enfriamiento poco después de quitarlo del bloque de calentamiento. Para ayudarlo en la interpretación, se recomienda la comparación con un control negativo.

Para obtener más información, comuníquese con Servicios técnicos de 3M Food Safety.

Explicación de los símbolos

www.3M.com/foodsafety/symbols

3M Food Safety

3M United States

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-800-328-6553

3M Canada

Post Office Box 5757
London, Ontario N6A 4T1
Canada
1-800-563-2921

3M Latin America

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-954-340-8263

3M Europe and MEA

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Strasse 1
D41453 Neuss/Germany
+49-2131-14-3000

3M United Kingdom PLC

Morley Street, Loughborough
Leicestershire
LE11 1EP
United Kingdom
+(44) 1509 611 611

3M Österreich GmbH

Euro Plaza
Gebaude J, A-1120 Wien
Kranichberggasse 4
Austria
+(43) 1 86 686-0

3M Asia Pacific

No 1, Yishun Avenue 7
Singapore, 768923
65-64508869

3M Japan

3M Health Care Limited
6-7-29, Kita-Shinagawa
Shinagawa-ku, Tokyo
141-8684 Japan
81-570-011-321

3M Australia

Bldg A, 1 Rivett Road
North Ryde, NSW 2113
Australia
611300 363 878



3M Health Care

2510 Conway Ave
St. Paul, MN 55144 USA
www.3M.com/foodsafety

© 2017, 3M. All rights reserved.
3M is a trademark of 3M. Used under license in Canada.
34-8721-8852-8



Clean-Trace™

Productinstructies

Oppervlakte allergenen eiwittest

Productbeschrijving en beoogd gebruik

De 3M™ Clean-Trace™ oppervlakte allergenen eiwittest is gebaseerd op de biureetreactie. In een basisch milieu vormen de koperionen (Cu^{2+}) een complex met peptideverbindingen van eiwit en worden gereduceerd tot Cu^+ . Bicinchoninezuur (BCA) in een basisch milieu is een uiterst gevoelig, stabiel en specifiek reagens dat een paars complex vormt met Cu^+ . De test biedt een schatting van eiwit aan de hand van kleurverandering. De 3M Clean-Trace allergenen eiwittest is een gevoelige eiwitdetectieswab, met een detectiegrens van ongeveer 3 µg van het totaal eiwit (waarbij runderalbumine als controle wordt gebruikt). De absolute grens varieert met de eiwitsamenstelling van geteste monsters. Bij het testen van oppervlakken, apparatuur en spoeloplossingen is het belangrijk op te merken dat enig residu een combinatie van allergene en niet-allergene eiwitten kan bevatten, maar ook eiwit-vrije materialen.

Een richtlijn voor de interpretatie van resultaten wordt geboden door testen bij 3M, die hebben aangetoond dat een positief 3M Clean-Trace allergen eiwittestresultaat gelijk zou kunnen staan aan de aanwezigheid van de volgende geschatte minimale hoeveelheden van allergene producten:

Referentiemateriaal

Allergeendetectiegrens	Gebruikte materiaal	Eiwitgehalte (%)
Ei 10-20 µg	NIST SRM8415 Heeleipoeder	30
Melk 10-20 µg	NIST SRM8435 Volle melkpoeder	25,9
Pinda 25-50 µg	NIST SRM2387 Pindakaas	22,2
Gluten 40 µg	Glutenmeel (van lokale oorsprong)	~83
Soja 20-40 µg	Sojameel (van lokale oorsprong)	~46,5
Amandel 20-40 µg	Hele amandel (van lokale oorsprong)	~19,5
Boekweit 20-40 µg	Boekweitmeel (van lokale oorsprong)	~13

De 3M Clean-Trace allergenen eiwittest kan worden gebruikt om eiwitresidu te detecteren op oppervlakken en in oplossingen, en daarmee bepalen of reiniging effectief is geweest wat betreft het elimineren van eiwitten, waaronder mogelijk allergene eiwitten. De interpretatie van resultaten varieert echter, afhankelijk van de specifieke toepassing. Het wordt daarom aanbevolen dat gebruikers de methode voor hun specifieke eisen controleren.

⚠️ Waarschuwingen

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor bijkomende informatie en de lokale regelgeving inzake afvalverwerking.






⚠️ Waarschuwingen

Eiwit is een veel voorkomende stof. Het is aanwezig op de huid, het haar en op veel oppervlakken. Raak de swab en het oppervlak dat u wilt testen niet aan.

Gebruik de 3M Clean-Trace allergenen eiwittest niet als de vervaldatum is verstreken.

De 3M Clean-Trace allergenen eiwittest detecteert eiwit en detecteert daarom geen residuen van producten met een laag eiwitgehalte of zonder eiwit.

Hoewel de 3M Clean-Trace allergenen eiwittest zeer gevoelig is, kan een oppervlak niet als allergenvrij worden beschouwd op grond van het resultaat van een 3M Clean-Trace allergenen eiwittest.



Bij normale concentraties is er minimale interferentie met de meeste gebruikelijke ontsmettingsmiddelen. Hoge concentraties alkalische reinigingsmiddelen kunnen echter in enkele gevallen fout-negatieve resultaten opleveren. Desinfecterende middelen op basis van peroxide kunnen een fout-positieve kleurveranderingsreactie veroorzaken met de 3M Clean-Trace allergenen eiwittest.

Verantwoordelijkheid van de Gebruiker

Gebruikers worden geacht zich vertrouwd te maken met de productinstructies en -informatie. Bezoek onze website www.3M.com/foodsafety, of neem contact op met uw plaatselijke 3M-vertegenwoordiger of -distributeur voor meer informatie.

Bij het kiezen van een testmethode is het belangrijk om te erkennen dat externe factoren zoals proefmethoden, testprotocollen, proefvoorbereiding en -behandeling en laboratoriumtechniek invloed kunnen hebben op de resultaten.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de selectie van een testmethode of product waarbij een voldoende aantal monsters met de geschikte matrices en microbiële problemen wordt onderzocht zodat de gekozen testmethode voldoet aan de criteria van de gebruiker.

Het is ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of testmethoden en resultaten voldoen aan de vereisten van klanten en leveranciers.

Zoals bij elke testmethode, garanderen de verkregen resultaten van het gebruik van een 3M Voedselveiligheidproduct de kwaliteit van de geteste matrices of processen niet.

Beperkte Garantie / Beperkte Verhaal

BEHALVE WAAR UITDRUKKELIJK VERMELD IN EEN BEPERKTE GARANTIEBEPALING VAN EEN INDIVIDUELE PRODUCTVERPAKKING, WIJST 3M ALLE UITDRUKKELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIJP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ELKE GARANTIE MET BETrekking tot DE GOEDE WERKING EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Als een 3M Voedselveiligheidproduct gebrekkig is, zal 3M of zijn gevormachtigde distributeur naar eigen keuze het product vervangen of de aankoopprijs van het product terugbetalen. Dit is het enige rechtsmiddel waarover u beschikt. Indien u vermoedt dat een product gebrekkig is, dan moet u 3M daarvan binnen de 60 dagen na het vaststellen op de hoogte brengen. Bel onze klantenservice (+31 (0)71 5450 342 of +32 (0)2 722 5224) of uw erkende vertegenwoordiger van 3M Voedselveiligheidproducten, voor een autorisatie voor het retourneren van de goederen.

Beperking van Aansprakelijkheid

3M IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE, ONGEACHT OF HET GAAT OM RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIJP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVERVING. In geen geval zal de wettelijke aansprakelijkheid van 3M onder om het even welke juridische theorie de aankoopprijs van het zogenaamd gebrekkige product overschrijden.

Opslag en afvalverwerking

Voor maximale houdbaarheid bewaren tussen 2-25 °C. Swabs zijn gedurende 14 dagen stabiel als ze worden verzonden of bewaard bij een hogere temperatuur. Houd de temperatuur bij deze bewaaroptie lager dan 35 °C. De vervaldatum en het lotnummer staan op elke verpakking. Na gebruik kan dit product micro-organismen bevatten die een potentieel biologisch gevaar kunnen veroorzaken. Volg de geldende normen van de sector om het product na gebruik te verwerken.

Gebruiksaanwijzingen

Zorg er voor aanvang van de testprocedure voor dat het verwarmingsblok, het waterbad of de incubator aan staat en is ingesteld op 55 °C.

1. Plaats de 3M Clean-Trace allergenen eiwittest ten minste 10 minuten voor gebruik in kamertemperatuur. Pak de handgreep van het monsterstokje vast en haal de swab uit het apparaat. Gebruik op droge oppervlakken de meegeleverde bevochtiger en breng 4 druppels aan op de swab OF breng 4 druppels aan op het te testen oppervlak [afbeelding 1].
2. Neem een monster van het testoppervlak. Beweeg, wanneer het praktisch mogelijk is, met de swab over een oppervlak van ongeveer 10 bij 10 cm. Beweeg in één richting over het oppervlak en vervolgens in de tegenovergestelde richting [afbeelding 2]. Oefen druk op de swab uit en draai de swab rond terwijl u het monster verzamelt. Dit is een herhaalbare en effectieve werkwijze [afbeelding 3]. Om een oplossing te testen, doopt u de swab in het monster en verwijdert u eventuele overtollige vloeistof langs de rand van de houder.

Opmerking: Test op de aanwezigheid van een desinfecterend middel (bijv. een pH-controle) in vloeibare monsters als een oplossing wordt getest.



3. Plaats het monsterstokje terug in de test met het handvat in de oorspronkelijke positie van de ongebruikte test. Op dit punt aangekomen, kunt u onmiddellijk activeren en meten of, als dat handiger is, de 3M Clean-Trace allergenen eiwittest van een etiket voorzien en maximaal vier uur onaangeroerd laten zodat u meerdere swabs tegelijkertijd kunt activeren en meten.
4. Om het monster te verwerken, drukt u stevig op de bovenkant van de handgreep van het monsterstokje van de 3M Clean-Trace allergenen eiwittest [afbeelding 4]. De handgreep schuift nu in het buisje van het apparaat. Als de handgreep volledig is ingedrukt, moet de bovenkant ervan evenwijdig zijn aan de bovenrand van de buis van het testapparaat. Pak het apparaat aan de bovenkant vast en schud het ten minste vijf seconden snel heen en weer om het monster en het reagens te vermengen [afbeelding 5]. De oplossing verkleurt mintgroen.
5. Plaats de 3M Clean-Trace allergenen eiwittest in een verwarmingsblok dat is voorverwarmd op 55 °C. Verwarm gedurende 15 minuten bij 55 °C. Vergelijk de kleur van de swab en de oplossing met het etiket van de 3M Clean-Trace allergenen eiwittest. Noteer de sterkste kleurverandering bij de oplossing of de swab als het eindresultaat.

Hoe u de 3M Clean-Trace Oppervlakte allergenen eiwittest het best kunt gebruiken	
Wel doen	Niet doen
De 3M Clean-Trace allergenen eiwittest VERTICAAL houden bij activering en snel ZIJWAARTS schudden gedurende ten minste 5 seconden.	Activeren terwijl het instrument niet verticaal wordt gehouden, op en neer schudden, hard schudden.
De 3M Clean-Trace allergenen eiwittest verticaal incuberen.	De 3M Clean-Trace allergenen eiwittest horizontaal incuberen.
De 3M Clean-Trace allergenen eiwittest na 15 minuten aflezen.	Eventuele kleurverandering na 15 minuten noteren.

Interpretatie

De kleur van de testreactie geeft de mate van eiwitresidu op het oppervlak aan. Door de kleur van de swab en de oplossing met het etiket van de 3M Clean-Trace allergenen eiwittest te vergelijken kan een schatting worden gemaakt van de oppervlaktereinheid.

- Groen geeft een goedkeurresultaat aan – Reinigen, geen verdere actie nodig
- Grijs is een onduidelijk resultaat – Opnieuw reinigen en opnieuw testen wordt aanbevolen.
- Paars geeft een afkeurresultaat aan – Opnieuw reinigen en opnieuw testen.

Bij verwarming vervaagt de mintgroene kleur en wordt helder met een blauwe tint voor negatieve monsters; bij afkoeling, kort na verwijdering uit het verwarmingsblok, verschijnt de groene kleur weer. Om te helpen bij de interpretatie wordt vergelijking met een negatieve controle aanbevolen.

Neem voor meer informatie contact op met de technische dienst van 3M Food Safety.

Verklaring van symbolen

www.3M.com/foodsafety/symbols

3M Food Safety

3M United States

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-800-328-6553

3M Canada

Post Office Box 5757
London, Ontario N6A 4T1
Canada
1-800-563-2921

3M Latin America

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-954-340-8263

3M Europe and MEA

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Strasse 1
D41453 Neuss/Germany
+49-2131-14-3000

3M United Kingdom PLC

Morley Street, Loughborough
Leicestershire
LE11 1EP
United Kingdom
+(44) 1509 611 611

3M Österreich GmbH

Euro Plaza
Gebaude J, A-1120 Wien
Kranichberggasse 4
Austria
+(43) 1 86 686-0

3M Asia Pacific

No 1, Yishun Avenue 7
Singapore, 768923
65-64508869

3M Japan

3M Health Care Limited
6-7-29, Kita-Shinagawa
Shinagawa-ku, Tokyo
141-8684 Japan
81-570-011-321

3M Australia

Bldg A, 1 Rivett Road
North Ryde, NSW 2113
Australia
611300 363 878



3M Health Care

2510 Conway Ave
St. Paul, MN 55144 USA
www.3M.com/foodsafety

© 2017, 3M. All rights reserved.
3M is a trademark of 3M. Used under license in Canada.
34-8721-8852-8

Clean-Trace™

Produktinformation

Surface Protein Allergen Test

Produktbeskrivning och avsedd användning

3M™ Clean-Trace™ Surface Protein Allergen Test är baserat på Biuret-reaktionen. Under alkaliska förhållanden formar kopparjonerna (Cu^{2+}) ett komplex med peptidbindningar till protein och reduceras till Cu^+ . Bicinchonsyra (BCA) är under alkaliska betingelser ett mycket känsligt, stabilt och specifikt reagens som bildar ett lila komplex med Cu^+ . Testet ger en uppskattning av protein med hjälp av ett färgförändringsresultat. 3M Clean-Trace Protein Allergen Test är en känslig proteinavkännande vaddpensel med en detektionsgräns på ca 3 µg totalt protein (med användning av bovint serumalbumin som kontroll). Den absoluta gränsen kommer att variera med proteinkompositionen i de prover som testas. Vid testning av ytor, utrustning och sköljlösningar är det viktigt att notera att en rest kan innehålla en blandning av allergiframkallande och icke-allergiframkallande proteiner, såväl som icke-proteinmaterial.

För att ge en viss vägledning ifråga om resultattolkningen har testning vid 3M visat att ett positivt resultat av 3M Clean-Trace Protein Allergen Test kan jämföras med närvaren av följande ungefärliga minimimängder av allergena produkter:

Referensmaterial

Detektionsgräns för allergen	Använt material	Proteininnehåll (%)
Ägg 10-20 µg	NIST SRM8415 heläggspulver	30
Mjölk 10-20 µg	NIST SRM8435 helmjölkspulver	25,9
Jordnöt 25-50 µg	NIST SRM2387 jordnötssmör	22,2
Gluten 40 µg	Glutenmjöl (lokalproducerat)	~83
Soja 20-40 µg	Sojamjöl (lokalproducerat)	~46,5
Mandel 20-40 µg	Hel mandel (lokalproducerad)	~19,5
Bovete 20-40 µg	Bovetemjöl (lokalproducerat)	~13

3M Clean-Trace Protein Allergen Test kan användas för att detektera proteinrester på ytor och i lösning och därigenom avgöra om en rengöring har varit effektiv ifråga om eliminering av proteiner, inklusive potentellt allergena proteiner. Tolkningen av resultaten varierar dock beroende på den specifika tillämpningen, så det rekommenderas att användarna validerar metoden för deras specifika krav.

⚠️ Varningar

Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information och lokala föreskrifter för kassering.

⚠️ Försiktighetsåtgärder






Protein är en vanlig substans. Den förekommer på hud, hår och på många ytor. Rör inte vid vaddpenseln eller ytan som ska testas.

Använd inte 3M Clean-Trace Protein Allergen Test efter dess utgångsdatum.

3M Clean-Trace Protein Allergen Test detekterar protein och kommer inte att detektera rester av produkter med lågt eller inget protein.

Även om 3M Clean-Trace Protein Allergen Test är mycket känsligt kan en yta inte anses vara fri från allergener baserat på resultatet från ett 3M Clean-Trace Protein Allergen Test.

Det finns minimal interferens med de vanligaste sanitetsmedel vid normala koncentrationer. Höga koncentrationer av alkaliska rengöringsmedel kan dock i vissa fall ge falskt negativa resultat. Peroxidbaserade desinfektionsmedel kan orsaka en falsk positiv färgförändringsreaktion med 3M Clean-Trace Protein Allergen Test.



Användaransvar

Det åligger användarna att bekanta sig med produktinstruktioner och produktinformation. Besök vår webbsida på adressen www.3M.com/foodsafety eller kontakta din lokala 3M-representant eller -leverantör för mer information.

Vid val av testmetod är det viktigt att inse att externa faktorer som provtagningsmetod, testprotokoll, provpreparering, hantering och laboratorietecknik kan påverka resultat.

Det åligger användaren att vid val av testmetoder utvärdera tillräckligt många prover med lämpliga matriser och utmaningar, för att övertyga användaren att den valda metoden uppfyller kraven.

Det åligger också användaren att fastställa att en testmetod och dess resultat uppfyller kraven från dennes kunder och leverantörer.

Liksom med alla testmetoder utgör inte resultat som erhållits från användning av någon produkt från 3M Livsmedelshygien en garanti för kvaliteten hos de matriser eller processer som testats.

Garantibegränsningar/Begränsad Ersättning

MED UNDANTAG AV VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I AVSNITT OM GARANTIBEGRÄNSNING FÖR INDIVIDUELLA FÖRPACKNINGAR, FRÅNSÄGER SIG 3M ALLA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ALLA GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET ELLER LÄAMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Om någon produkt från 3M Livsmedelshygien är defekt kommer 3M eller dess auktoriserade leverantör att efter eget gottfinnande ersätta produkten eller återbeta produktens inköpspris. Detta är den enda ersättning som ges. Kunden måste meddela 3M och returnera produkten inom sextio dagar efter upptäckt av misstänkt defekt. Var vänlig ring Kundtjänst (i USA: 1-800-328-1671) eller din officiella representant för 3M Livsmedelshygien för en auktorisation avseende återsändande av produkt.

Ansvarsbegränsning

3M KOMMER INTE ATT PÅTA SIG NÅGOT ANSVAR FÖR FÖRLUST ELLER SKADOR, VARE SIG DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER EFTERFÖLJANDE SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, FÖRLORADE VINSTER. Under inga omständigheter ska 3M:s ansvar i något som helst lagrum överskrida inköpspriset för den påstått defekta produkten.

Förvaring och kassering

Förvara mellan 2–25 °C (36–77 °F) för maximal hållbarhet. Alternativt är vaddpenslar stabila i 14 dagar när de fraktas eller förvaras vid förhöjd temperatur; för detta förvaringsalternativ får temperaturen inte överstiga 35 °C (95 °F). Utgångsdatum och partinummer finns markerade på varje påse. Efter användning kan verktyget innehålla mikroorganismer som kan innebära en potentiell biologisk risk. Följ gällande branschstandarder för kassering.

Bruksanvisning

Innan testproceduren påbörjas ska du se till att torrbadet, vattenbadet eller inkubatoren är påslagen och inställd till 55 °C (131 °F).

1. Placera 3M Clean-Trace Protein Allergen Test i rumstemperatur under minst 10 minuter före användning. Ta tag i provstickans grepp och avlägsna vaddpenseln från testverktyget. På torra ytor ska den tillhandahållna mjukgöraren användas. Applicera fyra droppar på vaddpenseln ELLER applicera fyra droppar på ytan som ska testas [figur 1].
2. Svabba testområdet. Där det går, svabba en provarea cirka tio gånger tio cm och svabba området först i en riktning och sedan i motsatt riktning [figur 2]. Applicera tryck på vaddpenseln och rotera den allt eftersom provet insamlas för att garantera återupprepningsbar och effektiv provtagning [figur 3]. För att testa en lösning, doppa vaddpenseln i provet och dra bort eventuell överskottsvätska mot sidan av kälet.

Obs! Testa för närvävo av saneringsmedel (t.ex. pH-kontroll) i flytande prov om en lösning testas.

3. Sätt tillbaka provstickan i testet med greppet i originalläget för det oanvända testet. Vid denna tidpunkt kan du antingen aktivera och mäta omedelbart, eller, om det passar bättre, så kan du märka ditt 3M Clean-Trace Protein Allergen Test och lämna det oaktiverat i upp till fyra timmar innan du aktiverar och mäter flera vaddpenslar samtidigt.
4. Bearbeta provet genom att med fast hand trycka ner toppen på greppet till provstickan i 3M Clean-Trace Protein Allergen Test [figur 4]. Greppet kommer att glida ner i anordningens rör och toppen på greppet ska vara i linje med toppen på anordningens rör när det är helt nertryckt. Ta tag i toppen på verktyget och skaka snabbt i sidled i minst fem sekunder för att blanda prov och reagens [figur 5]. Lösningen kommer att bli mintgrön.

5. Placera 3M Clean-Trace Protein Allergen Test i ett värmeförvar som har förvärmts till 55 °C (131 °F). Värm under 15 minuter vid 55 °C (131 °F). Jämför färgen för vaddpenseln och lösningen mot färgdiagrammet på etiketten för 3M Clean-Trace Protein Allergen Test. Registrera den starkaste färgförändringen i lösningen eller på vaddpenseln som slutresultat.

Hur man använder 3M Clean-Trace Surface Protein Allergen Test på bästa sätt	
Gör	Gör inte
Håll 3M Clean-Trace Protein Allergen Test i VERTIKALT läge vid aktivering och skaka snabbt från SIDA TILL SIDA under minst fem sekunder.	Aktivera inte när anordningen inte är i vertikal position, skaka inte upp och ner, skaka inte aggressivt.
Inkubera 3M Clean-Trace Protein Allergen Test vertikalt.	Inkubera 3M Clean-Trace Protein Allergen Test horisontellt.
Läs av 3M Clean-Trace Protein Allergen Test vid 15 minuter.	Registrera eventuell färgförändring efter 15 minuter.

Tolkning

Testreaktionens färg indikerar nivån av proteinrester på ytan. Genom att jämföra den färg som produceras mot etiketten för 3M Clean-Trace Protein Allergen Test kan en uppskattningsvärde om ytans renhet göras.

- Grön anger resultatet Godkänt – Rent, inga ytterligare åtgärder krävs.
- Grått indikerar inget resultat – Rengöring på nytt och upprepning av testet rekommenderas.
- Lila anger resultatet Icke-godkänt – Rengör på nytt och utför testet igen.

Vid uppvärming bleknar den mingröna färgen och blir klar med en blå nyans för negativa prov. Den gröna färgen återvänder efter kylning kort efter avlägsnandet från värmeförvarn. För att underlätta tolkningen rekommenderas jämförelse med negativ kontroll.

Kontakta 3M Livsmedelshygien tekniska tjänst för mer information.

Symbolförklaringar

www.3M.com/foodsafety/symbols

3M Food Safety

3M United States

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-800-328-6553

3M Canada

Post Office Box 5757
London, Ontario N6A 4T1
Canada
1-800-563-2921

3M Latin America

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-954-340-8263

3M Europe and MEA

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Strasse 1
D41453 Neuss/Germany
+49-2131-14-3000

3M United Kingdom PLC

Morley Street, Loughborough
Leicestershire
LE11 1EP
United Kingdom
+(44) 1509 611 611

3M Österreich GmbH

Euro Plaza
Gebaude J, A-1120 Wien
Kranichberggasse 4
Austria
+(43) 1 86 686-0

3M Asia Pacific

No 1, Yishun Avenue 7
Singapore, 768923
65-64508869

3M Japan

3M Health Care Limited
6-7-29, Kita-Shinagawa
Shinagawa-ku, Tokyo
141-8684 Japan
81-570-011-321

3M Australia

Bldg A, 1 Rivett Road
North Ryde, NSW 2113
Australia
611300 363 878



3M Health Care

2510 Conway Ave
St. Paul, MN 55144 USA
www.3M.com/foodsafety

© 2017, 3M. All rights reserved.
3M is a trademark of 3M. Used under license in Canada.
34-8721-8852-8

Clean-Trace™

Produktvejledning

Overflade Protein Allergen Test

Teknisk beskrivelse og tilsiget anwendung

3M™ Clean-Trace™ Overflade Protein Allergen Test er baseret på Biuret-reaktionen. Under basiske forhold danner kobber-ionerne (Cu^{2+}) et kompleks med peptidbindinger af protein, og reduceres til Cu^+ . Bicinchoninsyre (BCA) er under basiske forhold et yderst sensitivt, holdbart, og specifikt reagens for at Cu^+ danner et lilla kompleks. Testen giver en tilnærmelse af protein gennem et farveskift. 3M Clean-Trace Protein Allergen Test er en sensitiv proteindetektions svaber, med en detektionsgrænse på cirka 3 µg af det totale protein (ved anvendelse af Bovint Serumalbumin som kontrol). Den absolute grænse varierer afhængigt af proteinsammensætningen i de testede prøver. Når der testes overflader, udstyr og skyllevand er det vigtigt at bemærke, at rester kan indeholde en blanding af allergene og ikke-allergene proteiner, samt materialer som ikke er protein.

Som vejledning til fortolkning af resultaterne har tests hos 3M vist, at et positivt 3M Clean-Trace Protein Allergen Testresultat kan svare til tilstedeværelsen af de følgende cirka minimumsmængder af allergene produkter:

Referencemateriale

Allergen-detektionsgrænse	Materiale anvendt	Proteinindhold (%)
Æg 10-20 µg	NIST SRM8415 helæggepulver	30
Mælk 10-20 µg	NIST SRM8435 sødmælkspulver	25,9
Jordnød 25-50 µg	NIST SRM2387 jordnøddesmør	22,2
Gluten 40 µg	Mel med gluten (fra lokal kilde)	~83
Soja 20-40 µg	Sojamel (fra lokal kilde)	~46,5
Mandel 20-40 µg	Hel mandel (fra lokal kilde)	~19,5
Boghvede 20-40 µg	Boghvedemel (fra lokal kilde)	~13

3M Clean-Trace Protein Allergen Test kan anvendes til at detektere proteinrester på overflader og i opløsning, hvorved det kan bestemmes om rengøringen har været effektiv til at fjerne proteiner, herunder potentielt allergene proteiner. Dog vil fortolkning af resultaterne variere, afhængigt af den specifikke anvendelse, og derfor anbefales det at brugeren kontrollerer metoden til de specifikke krav.

⚠️ Advarsler

Se sikkerhedsdatabladet for yderligere oplysninger og lokale vedtægter for bortskaffelse.

⚠️ Forsigtighedsregler






Protein er en almindelig substans. Den findes i huden, håret og på mange andre overflader. Rør ikke ved vatpinden eller overfladen, som skal testes.

Anvend ikke 3M Clean-Trace Overflade Protein Allergen Test efter udløbsdatoen.

3M Clean-Trace Protein Allergen Test detekterer protein, og detekterer derfor ikke rester af produkter med lavt eller intet proteinindhold.

Selvom 3M Clean-Trace Protein-test er meget følsom, kan en overflade ikke antages som værende allergen-fri på baggrund af et 3M Clean-Trace Protein-testresultat.

Der er minimal interferens med det mest almindelige rengøringsmidler ved normale koncentrationer. Dog kan høje koncentrationer af basiske rengøringsmidler i visse tilfælde medføre falske negative resultater. Desinfektionsmidler baseret på peroxid kan forårsage falske positive farveændringsreaktioner med 3M Clean-Trace Protein Allergen Test.





Brugeransvar

Brugerne er ansvarlige for at gøre sig bekendt med produktvejledninger og oplysninger. Besøg vores hjemmeside på www.3M.com/foodsafety, eller kontakt din lokale 3M repræsentant eller distributør for yderligere oplysninger.

Når der vælges en testmetode, er det vigtigt, at man er klar over, at eksterne faktorer, såsom prøveudtagningsmetoder, testprotokoller, klargøring af prøven, håndtering samt laboratorieteknikker, kan påvirke resultaterne.

Det er brugerens eget ansvar at vælge en testmetode, som evaluerer et tilstrækkeligt antal prøver med de passende matricer og udfordringer for derved at sikre brugeren, at den valgte testmetode lever op til brugerens krav.

Det er også brugerens eget ansvar at fastsætte, at testmetoderne og resultaterne lever op til kundernes og leverandørernes krav.

Som med alle andre testmetoder gælder det, at de resultater, der opnås med dette 3M fødevareprodukt udstyr, ikke giver garanti for kvaliteten af detestede matricer og processer.

Begrænsning af Garantier / Begrænset Retsmiddel

BORTSET FRA HVAD DER ER UDTRYKKELIGT ANFØRT I DEN BEGRÆNSEDE GARANTI TIL INDIVIDUEL PRODUKTEMBALLAGE, FRASIGER 3M SIG ALLE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE GARANTIER INDBEFATTET MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ENHVER SALGBARHEDSGARANTI ELLER EGNETHED TILEN BESTEMT ANVENDELSE. Hvis et 3M Food Safety-produkt er behæftet med fejl eller mangler, vil 3M eller en af dennes autoriserede distributører efter dennes eget skøn udskifte eller refundere produktets købspris. Dette er den eneste til rådighed værende afhjælpning. Du skal straks, inden for 60 dage efter at have opdaget enhver formodet fejl ved et produkt, meddele dette og returnere produktet til 3M. Kontakt venligst kundeservice (1-800-328-1671 i USA) eller den autoriserede 3M fødevaresikkerhedskonsulent for at modtage en produktreturneringsautorisation.

Begrænsning af 3Ms Ansvar

3M SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR EVT. TAB ELLER SKADER, HVAD END DE ER OPSTÅET DIREKTE, INDIREKTE, UNDER SÆRLIGE OMSTÅNDIGHEDER ELLER TILFÆLDIGE SKADER INDBEFATTET MEN IKKE BEGRÆNSET TIL MISTET FORTJENESTE. Under ingen omstændigheder skal 3M's erstatningsansvar kunne overstige købsprisen af produktet der efter sigende er behæftet med fejl.

Opbevaring og bortskaffelse

For at opnå maksimal opbevaringstid opbevares mellem 2-25 °C (36-77 °F). Alternativt er svabere holdbare i 14 dage når de forsendes eller opbevares ved høj temperatur. Ved denne opbevaringsmulighed må temperaturen ikke overstige 35 °C (95 °F). Udløbsdato og partinummer er skrevet på hver pose. Kan indeholde mikroorganismer, der udgør en biologisk fare efter brug. Følg de gældende industristandarder for bortskaffelse.

Brugsanvisning

Før testproceduren påbegyndes sikres det at det tørre bad, vandbadet eller inkubatoren er tændt og indstillet til 55 °C (131 °F).

1. Placér 3M Clean-Trace Overflade Protein Allergen Test ved stuetemperatur mindst 10 minutter før brug. Hold i prøvepindens håndtag, og tag vatpinden ud af enheden. På tørre overflader anvendes den medfølgende fugter, ved at påføre 4 dråber på svaberden ELLER 4 dråber på overfladen som skal testet [figur 1].
2. Svabt testområdet. Hvor det er praktisk, svabres et område på cirka 10 × 10 cm, og området svabres i en retning og derefter i den modsatte retning [figur 2]. Tryk på vatpinden, og drej den samtidig med, at prøven indsamlas for at sikre gentaget og effektiv prøvetagning [figur 3]. For at teste en opløsning dyppes svaberden i prøven, og overskydende væske fjernes på beholderens side.

Bemærk: Test for tilstedeværelse af rengøringsmidler (f.eks. en pH-kontrol) i flydende prøver hvis en opløsning testes.

3. Indsæt prøvepinden i testen igen med håndtaget i den oprindelige position for den ubrugte test. På dette tidspunkt kan du enten aktivere og måle testen øjeblikkeligt, eller hvis det er mere praktisk, kan 3M Clean-Trace Protein Allergen Test mærkes og lades uaktiveret i op til fire timer før aktivering og måling af flere svabere samtidigt.
4. For at behandle prøven skal der trykkes hårdt ned på toppen af 3M Clean-Trace Protein Allergen-test prøvepindens håndtag [figur 4]. Håndtaget glider ind i enhedens rør, og toppen af håndtaget skal være på linje med toppen af testenhedens rør, når det presses helt ned. Hold toppen af enheden, og ryst hurtigt fra side til side i mindst fem sekunder for at blande prøven og reagenset [figur 5]. Opløsningen bliver mintgrøn.

5. Placér 3M Clean-Trace Protein Allergen Test i en Varmeblok som er opvarmet forinden til 55 °C (131 °F). Opvarm i 15 minutter ved 55 °C (131 °F). Sammenlign farven på svaberen og opløsningen med mærketet på 3M Clean-Trace Protein Allergen Test. Registrér den størkeste farveændring, i opløsningen eller på svaberen, som det endelige resultat.

Sådan anvendes 3M Clean-Trace Overflade Protein Allergen Test bedst	
GØR	GØR IKKE
Hold 3M Clean-Trace Protein Allergen Test i LODRET position når den aktiveres og ryst den hurtigt fra SIDE TIL SIDE i mindst 5 sekunder.	Aktivér, når den ikke er i lodret position, ryst den ikke op og ned, ryst den ikke voldsomt.
Inkubér 3M Clean-Trace Protein Allergen Test lodret.	Inkubér 3M Clean-Trace Protein Allergen Test vandret.
Aflæs 3M Clean-Trace Protein Allergen Test efter 15 minutter.	Registrér enhver farveændring efter 15 minutter.

Fortolkning

Farven på testreaktionen angiver niveauet af proteinrester på overfladen. Ved at sammenligne den fremkomne farve med mærketet på 3M Clean-Trace Protein Allergen Test kan der laves en vurdering af overfladens renhed.

- Grøn angiver et Godkendt resultat, Rent, ingen yderligere handling er påkrævet.
- Grå er tvetydigt, det anbefales at rengøre igen og gentage testen.
- Lilla angiver et Ikke godkendt resultat, rengør igen og gentag testen.

Ved opvarmning falmer den mintgrønne farve og bliver klar med et blåt skær for negative prøver. Den grønne farve vender tilbage når svaberen køler ned igen, kort tid efter den fjernes fra varmeblokken. For at gøre fortolkningen lettere anbefales det at sammenligne med en negativ kontrol.

For yderligere oplysninger kan du kontakte 3M Food Safety Technical Services.

Symbolforklaring

www.3M.com/foodsafety/symbols

3M Food Safety

3M United States

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-800-328-6553

3M Canada

Post Office Box 5757
London, Ontario N6A 4T1
Canada
1-800-563-2921

3M Latin America

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-954-340-8263

3M Europe and MEA

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Strasse 1
D41453 Neuss/Germany
+49-2131-14-3000

3M United Kingdom PLC

Morley Street, Loughborough
Leicestershire
LE11 1EP
United Kingdom
+(44) 1509 611 611

3M Österreich GmbH

Euro Plaza
Gebaude J, A-1120 Wien
Kranichberggasse 4
Austria
+(43) 1 86 686-0

3M Asia Pacific

No 1, Yishun Avenue 7
Singapore, 768923
65-64508869

3M Japan

3M Health Care Limited
6-7-29, Kita-Shinagawa
Shinagawa-ku, Tokyo
141-8684 Japan
81-570-011-321

3M Australia

Bldg A, 1 Rivett Road
North Ryde, NSW 2113
Australia
611300 363 878



3M Health Care

2510 Conway Ave
St. Paul, MN 55144 USA
www.3M.com/foodsafety

© 2017, 3M. All rights reserved.
3M is a trademark of 3M. Used under license in Canada.
34-8721-8852-8



Clean-Trace™

Produktveiledning

Protein allergentest til overflate

Produktbeskrivelse og tiltenkt bruk

3M™ Clean-Trace™ protein allergentest til overflate er basert på Biuret-reaksjonen. Under alkaliske forhold danner kobberionene (Cu^{2+}) et kompleks med peptidbindinger av protein og reduseres til Cu^+ . Bicinchoninsyre (BCA) under alkaliske forhold er et svært følsomt, stabilt og spesifikt reagens for Cu^+ som danner et lilla kompleks med Cu^+ . Testen gir en estimering av proteinrester ved hjelp av en fargeendring. 3M Clean-Trac Protein allergentest til overflate er en sensitiv vattpinne for proteindeteksjon med en påvisningsgrense på ca. 3 µg av totalt protein (ved hjelp av Bovine Serum Albumin som kontroll). Den absolute grensen vil variere med proteinsammensetningen av de testede prøvene. Ved testing av overflater, utstyr og skyllsninger er det viktig å merke seg at et restmateriale kan inneholde en blanding av allergifremkallende og ikke-allergifremkallende proteiner, samt ikke-proteinholdige materialer.

For å gi litt veiledning om tolkningen av resultatene, har testing ved 3M vist at et positivt resultat for 3M Clean-Trace Protein allergentest for overflate kan ligne tilstedeværelsen av følgende omtrentlige minimumsmengder allergifremkallende produkter:

Referansematerialer

Påvisningsgrense for allergen	Brukte materialer	Proteininnhold (%)
Egg 10-20 µg	NIST SRM8415 Eggpulver	30
Melk 10-20 µg	NIST SRM8435 Helmelkpulver	25,9
Peanøtt 25-50 µg	NIST SRM2387 Peanøttsmør	22,2
Gluten 40 µg	Glutenmel (lokalprodusert)	~83
Soya 20-40 µg	Soyamel (lokalprodusert)	~46,5
Mandel 20-40 µg	Hel mandel (lokalprodusert)	~19,5
Bokhvete 20-40 µg	Bokhvtemel (lokalprodusert)	~13

3M Clean-Trace Protein allergentest til overflate kan brukes til å påvise proteinrester på overflater og i oppløsning, og med det avgjøre om rengjøring har vært effektiv i eliminering av proteiner, inkludert potensielt allergeniske proteiner. Imidlertid vil tolkningen av resultatene variere, avhengig av spesifikk anvendelse, så det anbefales at brukerne validerer metoden for deres spesifikke krav.

⚠️ Advarsler

Se HMS-databladet for ytterligere informasjon og lokale forskrifter for avhending.

⚠️ Forhåndsregler






Protein er en vanlig substans. Det finnes på hud, hår og på mange overflater. Ikke ta på vattpinnen eller overflaten som skal testes.

Ikke bruk 3M Clean-Trace Protein allergentest til overflate etter utløpsdato.

3M Clean-Trace Protein allergentest til overflate påviser protein og vil således ikke oppdage rester av produkter med lav eller ingen protein.

Selv om 3M Clean-Trace Protein allergentest til overflate er svært følsom, kan ikke en overflate anses som allergifri på grunnlag av et resultat fra 3M Clean-Trace Protein allergentest til overflate.

Det er minimal interferens med de fleste vanlige desinfeksjonsmidler ved normale konsentrasjoner. Imidlertid kan høye konsentrasjoner av alkaliske rengjøringsmidler i noen tilfeller forårsake falske negative resultater. Peroksidbaserte desinfeksjonsmidler kan forårsake en falsk positiv fargeendringsreaksjon med 3M Clean-Trace Protein allergentest til overflate.



Brukeransvar

Brukere er ansvarlige for å sette seg inn i instruksjoner og informasjon om produktet. Besøk nettsiden vår www.3M.com/foodsafety eller kontakt din lokale representant eller distributør i 3M for mer informasjon.

Ved valg av testmetode er det viktig å ta hensyn til at eksterne faktorer som metoder for stikkprøver, testprotokoller, preparering av prøver, håndtering og laboratorieteknikk kan påvirke resultatene.

Ved valg av testmetode er det brukerens ansvar å vurdere et tilstrekkelig antall prøver med passende matriser og mikrobielle utfordringer for å tilfredsstille brukeren om at den valgte prøvemetoden oppfyller brukerens kriterier.

Det er også brukerens ansvar å fastslå at alle prøvemetoder og resultater tilfredsstiller kundens og forhandlerens forlangende.

Som med alle testmetoder, utgjør ikke resultatene som oppnås ved bruk av noe 3M Food Safety-produkt noen garanti om kvaliteten av matrisene eller prosessene som testes.

Begrensning av garantier / Begrensete rettigheter

MED MINDRE DET ER UTRYKKELIG SKREVET I EN BEGRENSET GARANTI PÅ EN PRODUKTPAKNING, FRASKRIVER 3M SEG ALLE DIREKTE OG INDIREKTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, ENHVER GARANTI OM SALGBARHET ELLER ANVENDELSE TIL ET BESTEMT FORMÅL. Hvis noe 3M Food Safety-produkt er defekt, vil 3M og dets autoriserte distributører erstatte eller refundere produktets kjøpesum etter eget skjønn. Dette er dine ubetingede rettigheter. Du må straks varsle 3M innen seksti dager fra oppdagelsen av enhver mulig feil i et produkt og returnere dette produktet til 3M. Ring kundeservice (06384 i Norge) eller ta kontakt med din offisielle 3M Food Safety-representant for en "returgodsavtale".

Begrensning av 3Ms ansvar

3M VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOE TAP ELLER SKADE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, SPESIELL, TILFELDIG ELLER FØLGESSKADE, INKLUDERT MED IKKE BEGRENSET TIL TAPT FORTJENESTE. Ikke under noen omstendighet skal 3Ms ansvar, under noen juridisk teori, overstige kjøpesummen for et produkt som antas å være defekt.

Oppbevaring og avhending

Lagres mellom 2-25 °C (36-77 °F) for maksimal holdbarhet. Alternativt er vattpinner stabile i 14 dager når de sendes eller lagres ved forhøyet temperatur; ikke overstig 35 °C (95 °F) for dette oppbevaringsalternativet. Utløpsdato og partinummer er trykket på hver pose. Kan, etter bruk, inneholde mikroorganismer som kan representere en mulig mikrobiologisk risiko. Følg gjeldende industristandarder for kasting.

Bruksanvisning

Før du starter testprosedyren, sørk for at tørrbadet, vannbadet eller inkubatoren er slått på og satt til 55 °C (131 °F).

1. Plasser 3M Clean-Trace Protein allergentest til overflate i romtemperatur i minst 10 minutter før bruk. Grip håndtaket på prøvepinnen og ta vattpinnen ut av enheten. Bruk fuktighetskremen som følger med på tørre overflater, og bruk 4 dråper til vattpinnen ELLER påfør 4 dråper til overflaten som skal testes [figur 1].
2. Pensle testområdet. Der det er praktisk, pensle et område som er ca. 10 × 10 cm og pensle området i en retning, og pensle så området i motsatt retning [figur 2]. Bruk trykk på vattpinnen og roter den etter som prøven er samlet for å sikre gjentatt og effektiv prøvetaking [figur 3]. For å teste en løsning, dyp vattpinnen i prøven og fjern eventuell overflødig væske på siden av karet.

Merk: Test for tilstedeværelse av saneringsmiddel (for eksempel pH-kontroll) i flytende prøver dersom en oppløsning blir testet.

3. Sett prøveplaten inn i testen med håndtaket satt inn i den opprinnelige posisjonen til den ubrukete testen. På dette tidspunktet kan du enten aktivere og måle umiddelbart, eller hvis det er mer praktisk kan 3M Clean-Trace Protein allergentest for overflate merkes og forlates uten å aktiveres i opptil fire timer før aktivering og måling av flere vattpinner samtidig.
4. For å behandle prøven, trykk godt på toppen av håndtaket til prøvepinnen for 3M Clean-Trace Protein Allergentest til overflate [figur 4]. Håndtaket vil gli inn i enhetsrøret, og toppen av håndtaket skal være på nivå med toppen av reagensrøret når det er helt nedtrykt. Grip toppen av enheten og rist raskt fra side til side i minst fem sekunder for å blande prøven og reagensen [figur 5]. Løsningen blir mintgrønn.
5. Plasser 3M Clean-Trace Protein Allergentest for overflate i en oppvarmingsblokk som er forvarmet til 55 °C (131 °F). Varm opp i 15 minutter ved 55 °C (131 °F). Sammenligne fargen på vattpinnen og løsningen mot etiketten til 3M Clean-Trace Protein allergentest til overflate. Registrer den sterkeste fargeendringen i løsningen som sluttresultatet.

Hvordan best utnytte 3M Clean-Trace Protein allergentest til overflate	
Gjør	Ikke gjør
Hold 3M Clean-Trace Protein allergentest til overflate i VERTIKAL posisjon ved aktivering og rist raskt fra SIDE TIL SIDE i minst 5 sekunder.	Aktiver når den ikke er i vertikal stilling, ikke rist opp eller ned, og ikke rist den aggressivt.
Inkuber 3M Clean-Trace Protein allergentest til overflate vertikalt.	Inkuber 3M Clean-Trace Protein allergentest til overflate horisontalt.
Les av 3M Clean-Trace Protein allergentest til overflate etter 15 minutter.	Registrer eventuell fargeendring etter 15 minutter.

Tolkning

Fargen på testreaksjonen indikerer nivået av proteinrester på overflaten. Ved å sammenligne fargen produsert mot 3M Clean-Trace Protein allergentest til overflate-etiketten, kan renheten av overflatens estimeres.

- Grønn indikerer at testen passerer – det er ikke behov for ytterligere tiltak.
- Grått er mangelfullt – det er anbefalt å rengjøre og teste på nytt.
- Lilla indikerer et resultat som feil – rengjør og test på nytt.

Ved oppvarming blekner den grønne fargen og blir klar med en blå tint for negative prøver; den grønne fargen går tilbake ved kjøling kort tid etter fjerning fra varmeblokken. For å hjelpe tolkning anbefales det å sammenligne med en negativ kontroll.

Ta kontakt med teknisk service i 3M Food Safety for mer informasjon.

Symbolforklaring

www.3M.com/foodsafety/symbols

3M Food Safety

3M United States

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-800-328-6553

3M Canada

Post Office Box 5757
London, Ontario N6A 4T1
Canada
1-800-563-2921

3M Latin America

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-954-340-8263

3M Europe and MEA

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Strasse 1
D41453 Neuss/Germany
+49-2131-14-3000

3M United Kingdom PLC

Morley Street, Loughborough
Leicestershire
LE11 1EP
United Kingdom
+(44) 1509 611 611

3M Österreich GmbH

Euro Plaza
Gebaude J, A-1120 Wien
Kranichberggasse 4
Austria
+(43) 1 86 686-0

3M Asia Pacific

No 1, Yishun Avenue 7
Singapore, 768923
65-64508869

3M Japan

3M Health Care Limited
6-7-29, Kita-Shinagawa
Shinagawa-ku, Tokyo
141-8684 Japan
81-570-011-321

3M Australia

Bldg A, 1 Rivett Road
North Ryde, NSW 2113
Australia
611300 363 878



3M Health Care

2510 Conway Ave
St. Paul, MN 55144 USA
www.3M.com/foodsafety

© 2017, 3M. All rights reserved.
3M is a trademark of 3M. Used under license in Canada.
34-8721-8852-8



Clean-Trace™

Tuoteseloste

Surface Protein Allergeeni pintatesti

Tuotteen kuvaus ja käyttötarkoitus

3M™ Clean-Trace™ Surface Protein Allergeeni pintatesti perustuu biureettireaktioon. Alkalisissa olosuhteissa kupari-ionit (Cu^{2+}) muodostavat proteiinin peptidisidoksiin sisältävän kompleksin ja muuttuvat Cu^+ :ksi. Bikiniinihappo (BCA) on emäksisissä olosuhteissa hyvin herkkä, stabiili ja spesifinen reagenssi Cu^+ :lle. Ne muodostavat yhdessä violetin kompleksin. Testissä värimuutoksen perusteella voidaan esittää arvio proteiinin määristä. 3M Clean-Trace Protein Allergeeni pintatesti on herkkä proteiinin havaitsemistipukko, jonka havaitsemisraja on noin 3 µg proteiinin kokonaismääristä (käytämällä naudan seerumialbumiinia kontrollina). Absoluuttinen raja vaihtelee testattujen näytteiden proteiinikontaminoiden mukaan. Pintojen, laitteiden ja huuhteluliuosten testauksessa on tärkeää huomioida, että jäännös voi sisältää sekoituksen allergeenisia ja ei-allergeenisia proteiineja sekä ei-proteiinimateriaaleja.

Tulosten tulkintaa koskevana ohjeena voidaan todeta 3M:n testauksissa ilmenneen, että 3M Clean-Trace Protein Allergeeni pintatestin tulokset ovat mahdollisesti verrattavissa seuraaviin likimääriin vähimäismääriin allergeenisten tuotteiden osalta:

Viitemateriaali

Allergeenin havaitsemisraja	Käytetty materiaali	Proteiinisisältö (%)
Kananmuna 10–20 µg	NIST SRM8415 Täysmunajauhe	30
Maito 10–20 µg	NIST SRM8435 Täysmaitojauhe	25,9
Maapähkinä 25–50 µg	NIST SRM2387 Maapähkinävoi	22,2
Gluteiini 40 µg	Gluteenijauho (paikallisesti hankittu)	~83
Sojja 20–40 µg	Soijajauhe (paikallisesti hankittu)	~46,5
Manteli 20–40 µg	Kokonaiset mantelit (paikallisesti hankittu)	~19,5
Tattari 20–40 µg	Tattarijauho (paikallisesti hankittu)	~13

3M Clean-Trace Protein Allergeeni pintatestiä voidaan käyttää pintojen ja liuosten proteiinijäämien havaitsemiseen ja siten määritämään, onko puhdistuksessa onnistuttu poistamaan kaikki proteiini, mukaan lukien mahdollisesti allergeeniset proteiinit. Tulosten tulkinta voi kuitenkin vaihdella riippuen testin käyttötavasta, joten on suosittavaa, että käyttäjät varmistavat mikä on heidän omiin vaatimuksiinsa sopiva menetelmä.

⚠ Varoitukset

Katso lisätietoja hävittämisestä ja paikallisista määräyksistä käyttöturvallisuustiedotteesta.






⚠ Tärkeät huomautukset

Proteiinin on yleinen aine. Sitä on ihossa, hiuksissa ja monilla pinnoilla. Älä kosketa testipukkia tai testattavaa pintaa.

Älä käytä 3M Clean-Trace Protein Allergeeni pintatestiä sen viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

3M Clean-Trace Protein Allergeeni pintatesti havaitsee proteiinin ja näin ollen se ei havaitse sellaisten tuotteiden jäämiä, joissa on vähän tai ei lainkaan proteiinia.

3M Clean-Trace Protein Allergeeni pintatesti on erittäin tarkka, mutta 3M Clean-Trace Protein Allergeeni pintatestistä saadun testituloksen perusteella pinta ei voida pitää allergeenivapaana.



Tavallisimmat puhdistusaineet vaikuttavat siihen vain hyvin vähän normaaleissa pitoisuksissa. Alkalisten puhdistusaineiden suuret pitoisuudet saattavat kuitenkin aiheuttaa joissakin tapauksissa väärää negatiivisia tuloksia. Peroksidipohjaiset desinfointiaineet voivat aiheuttaa väärän positiivisen värimuutosreaktion 3M Clean-Trace Protein Allergeeni pintatestissä.

Käyttäjän Vastuu

Käyttäjän vastuulla on tutustua tuotteen käyttöohjeisiin ja tietoihin. Saadaksesi lisätietoja vieraile verkkosivullamme osoitteessa www.3M.com/foodsafety, tai ota yhteyttä paikalliseen 3M tytäryhtiöön tai jälleenmyyjään.

Testausmenetelmää valitessa on tärkeää ottaa huomioon, että ulkoiset tekijät, kuten näytteenottomenetelmät, testausprotokollat, näytteiden valmistus, käsittely ja laboratorioteknikat voivat vaikuttaa testaustuloksiin.

Käyttäjä on aina testausmenetelmää valitessaan vastuussa siitä, että hän arvioi riittävän määrän näytteitä kyseisistä elintarvikkeista ja mikrobialtistuksista varmistamaan käyttäjän kriteerien täyttymisen.

Käyttäjän vastuulla on myös varmistaa, että testausmenetelmä ja tulokset täyttävät hänen asiakkaidensa tai toimittajiensa vaatimukset.

Kuten kaikkien testausmenetelmien kohdalla, minkä tahansa 3M Food Safety -tuotteen käytöstä saavutetut tulokset eivät ole takuu matriisien tai testatuiden prosessien laadusta.

Takuun Rajoitus / Rajoitettu Korvausvelvollisuus

3M KIISTÄÄ KAIKKI ERIKOIS JA EPÄSUORAT TAKUUT MUKAAN LUKIEN KAIKKI TAKUUT KÄYPYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, PAITSI JOS TUOTEPAKKAUKSEN TAKUUOSIOSSA TOISIN MAINITAAN. Jos mikä tahansa 3M Food Safety -tuote on viallinen, 3M tai sen valtuutettu jälleenmyyjä joko korvaa tuotteen tai palauttaa sen ostohinnan. Nämä ovat ainot myönnetyt korvaukset. Käyttäjän on ilmoitettava viipymättä kuudenkymmenen päivän sisällä kaikista epäillyistä tuotevirheistä ja palautettava tuote 3M:lle. Ota yhteys 3M Food Safety -edustajaan saadaksesi palautusohjeet.

3M:N Vastuun Rajoitukset

3M EI OLE VASTUUSSA MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, OLIVAT NE SITTEN SUORIA, EPÄSUORIA, ERITYISLAATUISIA, SATUNNAISIA TAI VÄLILLISIÄ, MUKAAN LUKIEN VOITONMENETYKSET. Missään tapauksessa 3M:n vastuu ei minkään laillisen perusteen mukaan ole suurempi kuin vialliseksi väitetyn tuotteen hinta.

Säilytys ja hävittäminen

Parhaimman säilyvyyden takaamiseksi säilytettävä 2–25 °C:n (36–77 °F:n) lämpötiloissa. Testipuikot puolestaan ovat stabiileja 14 päivän ajan, kun ne lähetetään tai säilytetään korkeammassa lämpötiloissa; tässä varastointivaihtoehdossa lämpötila ei saa ylittää 35 °C (95 °F). Viimeinen käyttöpäivämäärä ja eränumero on merkitty jokaiseen pussiin. Saattaa käytön jälkeen sisältää mikro-organismeja, jotka saattavat muodostaa biologisen vaaratekijän. Noudata hävittämisessä voimassa olevia alan standardeja.

Käyttöohjeet

Huolehdi ennen testin aloittamista, että kuivakylpy, vesihauda tai inkubaattori on käynnissä ja lämmöltään 55 °C (131 °F).

1. Aseta 3M Clean-Trace Protein Allergeeni pintatesti huoneenlämpöön ainakin 10 minuuttia ennen käyttöä. Tartu näytetikun varresta ja ota testipuikko laitteesta. Käytä kuivilla pinnoilla mukana tulevaa kostutinta ja lisää neljä pisaraa testipuikkoon TAI lisää neljä pisaraa testattavalle pinnalle [kuva 1].
2. Pyyhi testialuetta puikolla. Ota näyte kohteesta riippuen noin 10 × 10 cm:n suuruiselta alueelta ja pyyhi pintaa ensin toiseen suuntaan ja sen jälkeen vastakkaiseen suuntaan [kuva 2]. Näytteenkeruun toistettavuuden ja tehokkuuden takaamiseksi kerää näyte painamalla ja pyörittämällä testipuikkoa [kuva 3]. Kasta testipuikko näytteeseen ja poista kaikki astian ylimääräinen neste liuoksen testaamiseksi.

Huomio: Tarkista nestemäinen näyte puhdistusaineen varalta (esim. pH-testaus), jos testattavana on liuos.

3. Aseta näytetikku takaisin testiin niin, että varsi on samassa asennossa kuin käyttämättömässä testissä. Tässä vaiheessa voit joko aktivoida testin ja mitata pintatestin tuloksen välittömästi tai, jos se sopii sinulle paremmin, merkitä 3M Clean-Trace Protein Allergeeni pintatestin ja jättää sen jopa neljäksi tunniksi voidaksesi aktivoida ja tarkastaa useamman testipuikon tuloksen samanaikaisesti.

4. Käsittele näyte painamalla 3M Clean-Trace Protein Allergeeni pintatesti -näytetikun varren yläpäätä lujasti alas [kuva 4]. Varsi liukuu laitteen putkeen, ja varren yläpään tulee olla samassa tasossa testilaitteen putken yläpään kanssa, kun se on painettu kokonaan alas. Tarti laitteen yläosasta ja ravista nopeasti sivusuunnassa, jotta näyte ja reagenssi sekoittuvat [kuva 5]. Liuos muuttuu mintunvihreäksi.
5. Aseta 3M Clean-Trace Protein Allergeeni pintatesti lämpösyklilaitteeseen, joka on esilämmitetty 55 °C:n (131 °F:n) lämpöön. Lämmitä 15 minuutin ajan 55 °C:n (131 °F:n) lämmössä. Vertaa testipuikon ja liuoksen väriä 3M Clean-Trace Protein Allergeeni pintatestin etiketissä olevaan taulukkoon. Kirjaa lopputuloksena ylös liuoksen tai testipuikon voimakkain värimuutos.

Kuinka parhaiten hyödyntää 3M Clean-Trace Surface Protein Allergeeni pintatestiä	
Tee näin	Älä tee näin
Pidä 3M Clean-Trace Protein Allergeeni pintatestiä PYSTYASENNOSSA aktivoinnin aikana ja ravista sitä nopeasti SIVULTA SIVULLE ainakin viiden sekunnin ajan.	Älä aktivoi laitetta, jos se ei ole pystyasennossa, älä ravista sitä ylös ja alas, älä ravista rajusti.
Inkuboi 3M Clean-Trace Protein Allergeeni pintatesti pystyasennossa.	Älä inkuboi 3M Clean-Trace Surface Protein Herkkä pintatestiä vaaka-asennossa.
Tarkista 3M Clean-Trace Protein Allergeeni pintatesti 15 minuutin kuluttua.	Älä kirjaa ylös 15 minuutin jälkeen tapahtuvia muutoksia.

Tulkinta

Testireaktion väri osoittaa pinnan proteiinijäännösmäärän. Vertaamalla syntynyttä väriä 3M Clean-Trace Protein Allergeeni pintatestin etikettiin voidaan muodostaa arvio pinnan puhtaudesta.

- Vihreä merkitsee, että tulos on hyväksyttävä – Puhdas, muuta toimenpidettä ei tarvita.
- Harmaa merkitsee, ettei tulos ole selvä – On suositeltavaa suorittaa puhdistus ja testaus uudelleen.
- Violetti merkitsee, että tulos ei ole hyväksyttävä – Puhdista ja testaa uudelleen.

Mintunvihreä väri hälyvenee ja muuttuu aavistuksen sinertäväksi ja läpikuultavaksi lämmittääessä, kun näyte on negatiivinen; vihreä väri palaa pian sen jälkeen, kun testipuikko on poistettu lämpösyklilaitteesta ja jäähdytynyt. On suositeltavaa verrata näytettä negatiiviseen kontrollinäytteeseen tuloksen tulkinnan helpottamiseksi.

Lisätietoja saat 3M Food Safetyn teknisestä tukipalvelusta.

Merkkien selitykset

www.3M.com/foodsafety/symbols

3M Food Safety

3M United States

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-800-328-6553

3M Canada

Post Office Box 5757
London, Ontario N6A 4T1
Canada
1-800-563-2921

3M Latin America

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-954-340-8263

3M Europe and MEA

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Strasse 1
D41453 Neuss/Germany
+49-2131-14-3000

3M United Kingdom PLC

Morley Street, Loughborough
Leicestershire
LE11 1EP
United Kingdom
+(44) 1509 611 611

3M Österreich GmbH

Euro Plaza
Gebaude J, A-1120 Wien
Kranichberggasse 4
Austria
+(43) 1 86 686-0

3M Asia Pacific

No 1, Yishun Avenue 7
Singapore, 768923
65-64508869

3M Japan

3M Health Care Limited
6-7-29, Kita-Shinagawa
Shinagawa-ku, Tokyo
141-8684 Japan
81-570-011-321

3M Australia

Bldg A, 1 Rivett Road
North Ryde, NSW 2113
Australia
611300 363 878



3M Health Care

2510 Conway Ave
St. Paul, MN 55144 USA
www.3M.com/foodsafety

© 2017, 3M. All rights reserved.
3M is a trademark of 3M. Used under license in Canada.
34-8721-8852-8



Clean-Trace™

Instruções do Produto

Teste de Proteína Alergênicas de Superfície

Descrição e Uso recomendado do produto

O 3M™ Clean-Trace™ Teste de Proteína Alergênicas de Superfície é baseado na reação de Biureto. Em condições alcalinas os íons de cobre (Cu^{2+}) formam ligações peptídicas de proteína complexas e se tornam reduzidas a Cu^+ . O ácido bicinconínico (BCA) em condições alcalinas é um reagente altamente sensível, estável e específico que forma um complexo roxo com Cu^+ . O teste fornece uma estimativa de proteínas por meio da alteração da cor. O 3M Clean-Trace Teste de Proteína Alergênicas de Superfície é um swab de detecção sensível de proteína, com um limite de detecção de aproximadamente 3 μg do total de proteínas (usando Albumina de soro bovino como substância de controle). O limite absoluto irá variar com a composição da proteína das amostras testadas. Ao testar superfícies, equipamentos e soluções de enxague, é importante notar que um resíduo pode conter uma mistura de proteínas alergênicas e não alergênicas, conhecidas também como materiais não proteicos.

Para fornecer algumas diretrizes na interpretação dos resultados, os testes na 3M indicam um resultado positivo do 3M Clean-Trace Teste de Proteína Alergênicas de Superfície que poderia se equiparar a presença das seguintes quantidades aproximadas de produtos alergênicos:

Material de referência

Limite de detecção de alergênicos	Material usado	Conteúdo de proteínas (%)
Ovos 10-20 μg	NIST SRM8415 Ovos inteiros em pó	30
Leite 10-20 μg	NIST SRM8435 Ovos inteiros em pó	25.9
Amendoim 25-50 μg	NIST SRM2387 Pasta de amendoim	22.2
Glúten 40 μg	Farinha de glúten (de origem local)	~83
Soja 20-40 μg	Farinha de soja (de origem local)	~46.5
Amêndoas 20-40 μg	Amêndoas inteiras (de origem local)	~19.5
Grano sarraceno 20-40 μg	Farinha de grano sarraceno (de origem local)	~13

O 3M Clean-Trace Teste de Proteína Alergênicas de Superfície pode ser usado para detectar resíduos nas superfícies e em solução e assim determinar se as proteínas foram eliminadas de forma eficaz após a limpeza, incluindo proteínas alergênicas potenciais. No entanto, a interpretação dos resultados pode variar, dependendo da aplicação específica, por isso é recomendado que os usuários validem o método para seus requisitos específicos.

⚠️ Avisos

Consulte a Planilha de Dados de Segurança para obter informações adicionais e informações sobre os regulamentos locais para descarte.






⚠️ Precauções

A proteína é uma substância comum. Presente na pele, nos cabelos e em muitas superfícies. Não toque o swab ou a superfície a ser testada.

Não use o 3M Clean-Trace Teste de Proteína Alergênicas de Superfície após o vencimento.

O 3M Clean-Trace Teste de Proteína Alergênicas de Superfície detecta proteína e por isso detectará também resíduos de produto com pouca ou nenhuma presença de proteína.

Mesmo o 3M Clean-Trace Teste de Proteína Alergênicas de Superfície sendo muito sensível, uma superfície não pode ser considerada livre de alergênicos com base no resultado do 3M Clean-Trace Teste de Proteína Alergênicas de Superfície.





Há uma interferência mínima com a maioria dos antissépticos comuns em concentrações normais. No entanto, em alguns casos, altas concentrações de detergentes alcalinos podem causar falsos resultados negativos. Desinfetantes baseados em peróxido podem causar um falso positivo com a alteração da cor do resultado do 3M Clean-Trace Teste de Proteína Alergénicas de Superfície.

Responsabilidade do usuário

Os usuários são responsáveis por se familiarizar com as instruções e informações do produto. Visite nosso website em www.3M.com/foodsafety, ou contate o seu representante ou distribuidor 3M local para obter mais informações.

Ao selecionar qualquer método de teste, é importante considerar que fatores externos, como métodos de amostragem, protocolos de teste, preparo de amostras, manipulação e a técnica de laboratório utilizada, podem influenciar nos resultados.

É de responsabilidade do usuário, ao selecionar qualquer método de teste ou produto, avaliar um número suficiente de amostras com as matrizes e testes microbiológicos que permitam assegurar que os método escolhido satisfaça os critérios por ele estabelecidos.

Também é de responsabilidade do usuário determinar se o método de teste e os resultados satisfazem as exigências de seus clientes ou fornecedores.

Como em qualquer outro método, os resultados obtidos com qualquer produto da 3M Food Safety não constituem uma garantia da qualidade das matrizes ou processos com eles testados.

Limitações da Garantia

A 3M REJEITA TODOS OS TERMOS EXPRESSOS E IMPLÍCITOS DE GARANTIA, MAS SEM EXCLUSIVIDADE, QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO USO. Se ficar provado que qualquer produto da 3M Food Safety encontra-se defeituoso, a 3M ou seu distribuidor autorizado procederá, ao seu critério, à respectiva substituição ou restituição do dinheiro da compra do produto. Estes são os seus únicos termos de recurso. A 3M deverá ser prontamente notificada, dentro de sessenta dias da descoberta de qualquer defeito suspeito no produto e o mesmo deverá ser devolvido à 3M. Telefone para o Linha Aberta (0800-0132333) ou para o seu representante oficial da 3M Food Safety, a fim de obter uma Autorização de Devolução de Mercadoria.

Limitações de Responsabilidade da 3M

A 3M NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS, SEJAM DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU SUBSEQÜENTES, INCLUINDO, MAS SEM EXCLUSIVIDADE, A PERDA DE LUCROS. Exceto quando for proibido por lei, em nenhuma circunstância nem ao abrigo seja de que teoria jurídica for, deverá a responsabilidade da 3M exceder o preço de compra dos produtos supostamente defeituosos.

Armazenamento e descarte

Para a máxima conservação, armazene entre 2-25°C (36-77°F). Alternativamente, os swabs ficam estáveis por 14 dias quando enviados ou armazenados em altas temperaturas, por isso a opção de armazenamento não deve superar 35°C (95°F). A data de expiração e o número do lote estão indicados em cada embalagem. Após o uso, pode conter microrganismos com potencial risco à saúde. Siga as normas industriais vigentes para descarte.

Instruções de uso

Antes de começar o teste, certifique-se de que o sistema dry bath ou a incubadora estejam ligados a 55°C (131°F).

1. Coloque o 3M Clean-Trace Teste de Proteína Alergénicas de Superfície à temperatura ambiente pelo menos 10 minutos antes do uso. Segure a haste de amostra e remova o swab do dispositivo. Em superfícies secas, use o hidratante fornecido e aplique 4 gotas ao swab OU aplique 4 gotas à superfície a ser testada [figura 1].
2. Passe o swab na área de teste. Sempre que possível, passe o swab em uma área de aproximadamente 10 cm por 10 cm em uma única direção, depois passe o swab na direção oposta [figure 2]. Aplique pressão no swab girando-o à medida que a amostra for coletada para garantir uma amostragem repetível e eficiente [figura 3]. Para testar a solução, imerja o swab na amostra e remova qualquer excesso de líquido na lateral do recipiente.

Observação: Teste a presença de agente desinfetante (por exemplo, verificação de pH) em amostras líquidas se uma solução for testada.

3. Insira a haste da amostra no teste novamente com a alça na posição original do teste antes de ser utilizado. Depois disso, você pode ativar e ler imediatamente ou, se preferir, o 3M Clean-Trace Teste de Proteína Alergénicas de Superfície pode ser etiquetado e deixado sem ativação por até quatro horas antes da ativação e da medida de múltiplos swabs simultaneamente.



4. Para processar a amostra, empurre firmemente a haste da parte superior da alça da amostra do 3M Clean-Trace Teste de Proteína Alergênicas de Superfície [figura 4]. A haste deslizará para dentro do tubo do dispositivo de teste e a parte superior da haste ficará nivelada com a parte superior do tubo do dispositivo de teste quando totalmente assentada. Segure a parte superior do dispositivo de teste e agite-o lateralmente por pelo menos cinco segundos para misturar a amostra e o reagente [figura 5]. A solução tornará verde menta.
5. Coloque o 3M Clean-Trace Teste de Proteína Alergênicas de Superfície no bloco de aquecimento pré-aquecido a uma temperatura de 55°C (131°F). Aqueça-o por 15 minutos a 55°C (131°F). Compare a cor do swab e da solução comparando-as com a etiqueta da tabela do 3M Clean-Trace Teste de Proteína Alergênicas de Superfície. Registre a cor mais forte na solução ou no swab como resultado final.

Como melhor utilizar o 3M Clean-Trace Teste de Proteína Alergênicas de Superfície	
Faça	Não faça
Segure o 3M Clean-Trace Teste de Proteína Alergênicas de Superfície em posição VERTICAL durante a ativação e agite-o rapidamente LATERALMENTE por pelo menos 5 segundos.	Para a ativação quando não estiver na posição vertical, não agite para cima e para baixo e não agite agressivamente.
Incube o 3M Clean-Trace Teste de Proteína Alergênicas de Superfície verticalmente.	Não incube o 3M Clean-Trace Teste de Proteína Alergênicas de Superfície horizontalmente.
Leia o 3M Clean-Trace Teste de Proteína Alergênicas de Superfície logo após 15 minutos.	Não registre qualquer alteração de cor após 15 minutos.

Interpretação

A cor da reação do teste indicará o nível dos resíduos de proteína na superfície. Ao comparar a cor do 3M Clean-Trace Teste de Proteína Alergênicas de Superfície com a etiqueta poderá ser feita uma estima da limpeza da superfície.

- O verde indica o resultado Aprovado, limpo, nenhuma ação adicional necessária.
- O resultado cinza não é conclusivo, é recomendado limpar e realizar o teste novamente.
- O roxo indica o resultado Reprovado, limpe e faça o teste novamente.

Ao aquecer, a cor verde menta desaparece e torna-se clara com uma tonalidade azul para amostras negativas; a cor verde retorna ao esfriar logo após a remoção do bloco de aquecimento. Para facilitar a interpretação, recomenda-se a comparação com um controle negativo.

Para obter mais informações, entre em contato o departamento de Serviços Técnicos e Segurança Alimentar da 3M.

Explicação dos símbolos

www.3M.com/foodsafety/symbols

3M Food Safety

3M United States

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-800-328-6553

3M Canada

Post Office Box 5757
London, Ontario N6A 4T1
Canada
1-800-563-2921

3M Latin America

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-954-340-8263

3M Europe and MEA

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Strasse 1
D41453 Neuss/Germany
+49-2131-14-3000

3M United Kingdom PLC

Morley Street, Loughborough
Leicestershire
LE11 1EP
United Kingdom
+(44) 1509 611 611

3M Österreich GmbH

Euro Plaza
Gebaude J, A-1120 Wien
Kranichberggasse 4
Austria
+(43) 1 86 686-0

3M Asia Pacific

No 1, Yishun Avenue 7
Singapore, 768923
65-64508869

3M Japan

3M Health Care Limited
6-7-29, Kita-Shinagawa
Shinagawa-ku, Tokyo
141-8684 Japan
81-570-011-321

3M Australia

Bldg A, 1 Rivett Road
North Ryde, NSW 2113
Australia
611300 363 878



3M Health Care

2510 Conway Ave
St. Paul, MN 55144 USA
www.3M.com/foodsafety

© 2017, 3M. All rights reserved.
3M is a trademark of 3M. Used under license in Canada.
34-8721-8852-8



Clean-Trace™

Πληροφορίες προϊόντος

Τεστ Επιφανειών Protein Αλλεργιογόνου Πρωτεΐνης

Περιγραφή του προϊόντος και σκοπός χρήσης

Το 3M™ Clean-Trace™ Τεστ Επιφανειών Protein Αλλεργιογόνου Πρωτεΐνης είναι βασισμένο στην αντίδραση διουρίας. Υπό αλκαλικές συνθήκες, τα ιόντα χαλκού (Cu^{2+}) σχηματίζουν ένα σύμπλοκο με πεπτιδικούς δεσμούς πρωτεΐνης και υπόκεινται σε αναγωγή σε Cu^+ . Το δικιγχονινικό οξύ (BCA) υπό αλκαλικές συνθήκες είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο, σταθερό και ειδικό αντιδραστήριο το οποίο σχηματίζει ένα μοβ σύμπλοκο με Cu^+ . Το τεστ παρέχει μια εκτίμηση της πρωτεΐνης μέσω χρωματικής μεταβολής. Το 3M Clean-Trace Τεστ Αλλεργιογόνου Πρωτεΐνης είναι ένας ευαίσθητος στυλεός ανίχνευσης πρωτεΐνης, με όριο ανίχνευσης περίπου 3 μg ολικής πρωτεΐνης (χρησιμοποιώντας λευκωματίνη βόρειου ορού ως μάρτυρα). Το απόλυτο όριο θα ποικίλλει με τη σύνθεση πρωτεΐνης των υπό έλεγχο δειγμάτων. Κατά τον έλεγχο επιφανειών, εξοπλισμού και διαλυμάτων έκπλυσης, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ένα κατάλοιπο μπορεί να περιέχει ένα μίγμα αλλεργιογόνων και μη αλλεργιογόνων πρωτεΐνων, καθώς και μη πρωτεΐνικών υλικών.

Για την παροχή καθοδήγησης σχετικά με την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, οι έλεγχοι στην 3M έχουν καταδείξει ότι ένα θετικό αποτέλεσμα του 3M Clean-Trace Τεστ Αλλεργιογόνου Πρωτεΐνης θα μπορούσε να ισοδυναμεί με την παρουσία των ακόλουθων κατά προσέγγιση ελάχιστων ποσών αλλεργιογόνων προϊόντων:






Υλικό αναφοράς

Όριο ανίχνευσης αλλεργιογόνου	Υλικό που χρησιμοποιείται	Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (%)
Αυγό 10-20 μg	NIST SRM8415 Σκόνη πλήρους αυγού	30
Γάλα 10-20 μg	NIST SRM8435 Σκόνη πλήρους γάλακτος	25,9
Αραχίδες 25-50 μg	NIST SRM2387 Φυστικοβούτυρο	22,2
Γλουτένη 40 μg	Αλεύρι γλουτένης (τοπικής προέλευσης)	~83
Σόγια 20-40 μg	Αλεύρι σόγιας (τοπικής προέλευσης)	~46,5
Αμύγδαλα 20-40 μg	Πλήρη αμύγδαλα (τοπικής προέλευσης)	~19,5
Φαγόπυρο 20-40 μg	Αλεύρι φαγόπυρου (τοπικής προέλευσης)	~13

Το 3M Clean-Trace Τεστ Αλλεργιογόνου Πρωτεΐνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση υπολειμμάτων πρωτεΐνών στις επιφάνειες και σε διάλυμα και ως εκ τούτου για τον καθορισμό του εάν ο καθαρισμός ήταν αποτελεσματικός στην εξάλειψη των πρωτεΐνών, συμπεριλαμβανομένων δυνητικά αλλεργιογόνων πρωτεΐνών. Ωστόσο, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων θα ποικίλλει ανάλογα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, συνεπώς συνιστάται οι χρήστες να επικυρώσουν τη μέθοδο για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις τους.

Διαδικασία εργασίας

Συμβουλευθείτε το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας για πρόσθετες πληροφορίες και τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη.





Δ Συστάσεις προσοχής

Η πρωτεΐνη είναι μια κοινή ουσία. Είναι παρούσα στο δέρμα, στα μαλλιά και σε πολλές επιφάνειες. Μην αγγίζετε τον στυλεό ή την επιφάνεια προς έλεγχο.

Μη χρησιμοποιείτε το 3M Clean-Trace Τεστ Αλλεργιογόνου Πρωτεΐνης μετά την ημερομηνία λήξης.

Το 3M Clean-Trace Τεστ Αλλεργιογόνου Πρωτεΐνης ανιχνεύει την πρωτεΐνη και έτσι δεν θα ανιχνεύσει υπολείμματα προϊόντων με χαμηλή ή μηδενική παρουσία πρωτεΐνης.

Παρ' ότι η δοκιμασία 3M Clean-Trace Τεστ Αλλεργιογόνου Πρωτεΐνης είναι πολύ ευαίσθητη, μια επιφάνεια δεν μπορεί να θεωρηθεί ελεύθερη αλλεργιογόνων με βάση ένα αποτέλεσμα του 3M Clean-Trace Τεστ Αλλεργιογόνου Πρωτεΐνης.

Υπάρχει ελάχιστη παρεμβολή με τα περισσότερα μέσα εξυγίανσης σε κανονικές συγκεντρώσεις. Ωστόσο, υψηλές συγκεντρώσεις αλκαλικών καθαριστικών ενδέχεται να προκαλέσουν ψευδή αρνητικά αποτελέσματα σε ορισμένες περιπτώσεις. Απολυμαντικά με βάση υπεροξείδιο μπορούν να προκαλέσουν ψευδή θετική αντίδραση χρωματικής μεταβολής με το 3M Clean-Trace Τεστ Αλλεργιογόνου Πρωτεΐνης.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι να εξοικειωθούν με τις οδηγίες και τις πληροφορίες του προϊόντος. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.3M.com/foodsafety, ή επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή διανομέα της 3M για περισσότερες πληροφορίες.

Κατά την επιλογή μίας μεθόδου ελέγχου, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε ότι οι εξωτερικοί παράγοντες, όπως μέθοδοι δειγματοληψίας, πρωτόκολλα ελέγχου, προετοιμασία και χειρισμός δειγμάτων και η εργαστηριακή τεχνική μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.

Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να επιλέξει οποιαδήποτε μέθοδο ή προϊόν ελέγχου, για να αξιολογήσει έναν επαρκή αριθμό δειγμάτων με τις κατάλληλες μήτρες και μικροβιακές προκλήσεις, ώστε η επιλεγμένη μέθοδος να ικανοποιεί τα κριτήρια του χρήστη.

Αποτελεί επίσης ευθύνη του χρήστη να καθορίσει ότι όλες οι μέθοδοι δοκιμής και τα αποτελέσματα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών και των προμηθευτών του.

Όπως και με κάθε μέθοδο ελέγχου, τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος 3M Food Safety δεν συνιστούν εγγύηση της ποιότητας των μητρών ή των διαδικασιών που υποβάλλονται σε έλεγχο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, Η 3M ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΆΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ. Εάν οποιοδήποτε προϊόν 3M Food Safety είναι ελαττωματικό, η 3M ή ο εξουσιοδοτημένος διανομέας της, κατά την κρίση τους, θα αντικαταστήσουν ή επιστρέψουν την τιμή αγοράς του προϊόντος. Αυτές είναι οι αποκλειστικές σας αποκαταστάσεις. Πρέπει άμεσα και εντός εξήντα ημερών να γνωστοποιήσετε στην 3M την ανακάλυψη των πιθανολογούμενων ελαττωμάτων του προϊόντος και να επιστρέψετε το προϊόν στην 3M. Παρακαλούμε καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (010-6885300 στην Ελλάδα) ή τον επίσημο αντιπρόσωπο Ασφάλειας Τροφίμων της 3M για την Έγκριση Επιστροφής Προϊόντων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3M

Η 3M ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ή ΖΗΜΙΑ, ΕΙΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΆΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ. Η ευθύνη της 3M δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση και υπό καμία νομική θεωρία την τιμή αγοράς του προϊόντος που εικάζεται ότι είναι Ελαττωματικό.

Αποθήκευση και απόρριψη

Για μέγιστη διάρκεια ζωής, αποθηκεύστε σε θερμοκρασία μεταξύ 2-25 °C (36-77 °F). Εναλλακτικά, οι στυλεοί είναι σταθεροί για 14 ημέρες όταν αποστέλλονται ή αποθηκεύονται σε αυξημένη θερμοκρασία· για αυτήν την επιλογή αποθήκευσης, η θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 35 °C (95 °F). Η ημερομηνία λήξης και ο αριθμός παρτίδας αναγράφονται σε κάθε σακουλάκι. Μετά τη χρήση, μπορεί να περιέχουν μικροοργανισμούς που ενδέχεται να αποτελούν πιθανό βιολογικό κίνδυνο. Ακολουθείτε τα τρέχοντα βιομηχανικά πρότυπα για την απόρριψη.



Οδηγίες χρήσης

Πριν την έναρξη της διαδικασίας ελέγχου, διασφαλίστε ότι το ξηρό λουτρό, το υδατόλουτρο ή ο επωαστήρας είναι ενεργοποιημένο(ος) και ρυθμισμένο(ος) για 55 °C (131 °F).

- Θέστε το 3M Clean-Trace Τεστ Αλλεργιογόνου Πρωτεΐνης σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν τη χρήση. Κρατήστε τη λαβή του στυλεού δείγματος και αφαιρέστε τον στυλέο από τη συσκευή. Σε ξηρές επιφάνειες, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο ενυδατικό μέσο και εφαρμόστε 4 σταγόνες στον στυλέο Ή εφαρμόστε 4 σταγόνες στην επιφάνεια προς έλεγχο [εικόνα 1].
- Λάβετε επίχρισμα από την υπό έλεγχο περιοχή. Όπου είναι πρακτικά δυνατό, λάβετε επίχρισμα από μια περιοχή περίπου 10 εκ. επί 10 εκ. και κινήστε τον στυλέο στην περιοχή προς τη μία κατεύθυνση και στη συνέχεια προς την αντίθετη κατεύθυνση [εικόνα 2]. Ασκήστε πίεση στον στυλέο και περιστρέψτε τον στυλέο κατά τη συλλογή του δείγματος, προκειμένου να διασφαλίσετε την επαναλαμβανόμενη και αποτελεσματική δειγματοληψία [εικόνα 3]. Για να ελέγξετε ένα διάλυμα, βυθίστε τον στυλέο μέσα στο δείγμα και αφαιρέστε το περίσσιο υγρό επάνω στην πλευρά του δοχείου.
- Σημείωση:** Ελέγξτε για την παρουσία παράγοντα εξυγίανσης (π.χ. έλεγχος pH) στα υγρά δείγματα εάν ελέγχεται ένα διάλυμα.
- Εισαγάγετε εκ νέου τον στυλέο μέσα στο τεστ με τη λαβή εισαγμένη στην αρχική θέση του αχρησιμοποίητου τεστ. Σε αυτό το σημείο, μπορείτε είτε να ενεργοποιήσετε και να μετρήσετε το τεστ αμέσως είτε, εάν είναι πιο βολικό, το 3M Clean-Trace Τεστ Αλλεργιογόνου Πρωτεΐνης μπορεί να επισημανθεί με ετικέτα και να αφεθεί μη ενεργοποιημένο για έως και τέσσερις ώρες πριν την ενεργοποίηση και τη μέτρηση πολλαπλών στυλεών ταυτόχρονα.
- Για να επεξεργαστείτε το δείγμα, σπρώξτε προς τα κάτω σταθερά το επάνω μέρος της λαβής του στυλεού δείγματος του 3M Clean-Trace Τεστ Αλλεργιογόνου Πρωτεΐνης [εικόνα 4]. Η λαβή θα ολισθήσει μέσα στον σωλήνα της συσκευής και το επάνω μέρος της λαβής πρέπει να έλθει στο ίδιο επίπεδο με το επάνω μέρος του σωλήνα της συσκευής όταν πιεστεί τελείως. Κρατήστε το επάνω μέρος της συσκευής και ανακινήστε γρήγορα από πλευρά σε πλευρά για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα για να αναμίξετε το δείγμα και το αντιδραστήριο [εικόνα 5]. Το διάλυμα θα αποκτήσει χρώμα πράσινο της μέντας.
- Τοποθετήστε το 3M Clean-Trace Τεστ Αλλεργιογόνου Πρωτεΐνης μέσα σε θερμαντικό μπλοκ που έχει προθερμανθεί στους 55 °C (131 °F). Θερμάνετε για 15 λεπτά στους 55 °C (131 °F). Συγκρίνετε το χρώμα του στυλεού και του διαλύματος έναντι της ετικέτας του 3M Clean-Trace Τεστ Αλλεργιογόνου Πρωτεΐνης. Καταγράψτε την εντονότερη χρωματική μεταβολή στο διάλυμα ή στον στυλέο ως το τελικό αποτέλεσμα.

Πώς να αξιοποιήσετε καλύτερα το 3M Clean-Trace Τεστ Επιφανειών Protein Αλλεργιογόνου Πρωτεΐνης	
Τι να κάνετε	Τι να μην κάνετε
Κρατάτε το 3M Clean-Trace Τεστ Αλλεργιογόνου Πρωτεΐνης σε ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ θέση κατά την ενεργοποίηση και ανακινείτε γρήγορα από ΠΛΕΥΡΑ ΣΕ ΠΛΕΥΡΑ για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.	Ενεργοποιείτε όταν δεν βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση, μην ανακινείτε πάνω και κάτω, μην ανακινείτε επιθετικά.
Επωάζετε το 3M Clean-Trace Τεστ Αλλεργιογόνου Πρωτεΐνης κατακόρυφα.	Επωάζετε το 3M Clean-Trace Τεστ Αλλεργιογόνου Πρωτεΐνης οριζόντια.
Διαβάζετε το 3M Clean-Trace Τεστ Αλλεργιογόνου Πρωτεΐνης στα 15 λεπτά.	Καταγράφετε οποιαδήποτε χρωματική μεταβολή μετά τα 15 λεπτά.

Ερμηνεία

Το χρώμα της αντίδρασης του ελέγχου θα υποδεικνύει το επίπεδο των υπολειμμάτων πρωτεΐνης στην επιφάνεια. Συγκρίνοντας το παραγόμενο χρώμα έναντι της ετικέτας του 3M Clean-Trace Τεστ Αλλεργιογόνου Πρωτεΐνης μπορεί να πραγματοποιηθεί μια εκτίμηση της καθαριότητας της επιφάνειας.

- Το πράσινο υποδεικνύει ένα αποτέλεσμα Πέρασε - Καθαρό, δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια.
- Το γκρι είναι ασαφές – Συνιστάται να καθαρίσετε ξανά και να επαναλάβετε τον έλεγχο.
- Το μοβ υποδεικνύει ένα αποτέλεσμα Απέτυχε - Καθαρίστε ξανά και επαναλάβετε τον έλεγχο.



Με τη θέρμανση, το πράσινο της μέντας ξεθωριάζει και γίνεται διαυγές με μια μπλε απόχρωση για τα αρνητικά δείγματα· το πράσινο χρώμα επιστρέφει με την ψύξη μετά την απομάκρυνση από το θερμαντικό μπλοκ. Για βοήθεια κατά την ερμηνεία, συνιστάται σύγκριση με έναν αρνητικό μάρτυρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις Τεχνικές Υπηρεσίες της 3M Food Safety.

Επεξήγηση των συμβόλων

www.3M.com/foodsafety/symbols

3M Food Safety

3M United States

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-800-328-6553

3M Canada

Post Office Box 5757
London, Ontario N6A 4T1
Canada
1-800-563-2921

3M Latin America

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-954-340-8263

3M Europe and MEA

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Strasse 1
D41453 Neuss/Germany
+49-2131-14-3000

3M United Kingdom PLC

Morley Street, Loughborough
Leicestershire
LE11 1EP
United Kingdom
+(44) 1509 611 611

3M Österreich GmbH

Euro Plaza
Gebaude J, A-1120 Wien
Kranichberggasse 4
Austria
+(43) 1 86 686-0

3M Asia Pacific

No 1, Yishun Avenue 7
Singapore, 768923
65-64508869

3M Japan

3M Health Care Limited
6-7-29, Kita-Shinagawa
Shinagawa-ku, Tokyo
141-8684 Japan
81-570-011-321

3M Australia

Bldg A, 1 Rivett Road
North Ryde, NSW 2113
Australia
611300 363 878



3M Health Care

2510 Conway Ave
St. Paul, MN 55144 USA
www.3M.com/foodsafety

© 2017, 3M. All rights reserved.
3M is a trademark of 3M. Used under license in Canada.
34-8721-8852-8



Clean-Trace™

Informacje o produkcie

Test do detekcji alergenów na powierzchni

Opis i przeznaczenie produktu

3M™ Clean-Trace™ test do detekcji alergenów na powierzchni jest oparty na reakcji biuretowej. W warunkach zasadowych jony miedzi (Cu^{2+}) tworzą związek z wiązaniem peptydowym białka i ulegają redukcji do Cu^+ . W warunkach zasadowych kwas bicinchoninowy (BCA) stanowi wysoce czuły, stabilny i swoisty reagent dla Cu^+ , tworząc fioletowy związek. Test ten zapewnia ocenę obecności białek za pośrednictwem wyniku w postaci zmiany koloru. 3M™ Clean-Trace™ test do detekcji alergenów to czuła wymazówka do wykrywania białek z granicą detekcji wynoszącą około 3 µg (wykorzystująca albuminę surowicy bydlęcej). Limit całkowity będzie różny w zależności od składu białka badanych próbek. Podczas badania powierzchni, urządzeń i roztworów płuczących ważne jest, by pamiętać, że pozostałości mogą zawierać mieszaninę białek alergizujących i niealergizujących, a także materiałów niezawierających białek.

W celu udzielenia pomocy w zakresie interpretacji wyników, badania w firmie 3M wykazały, że dodatni wynik 3M Clean-Trace testu do detekcji alergenów może odpowiadać obecności następujących przybliżonych ilości minimalnych poszczególnych produktów:

Materiał referencyjny

Limit detekcji alergenu	Wykorzystany materiał	Zawartość białka (%)
Jajo 10–20 µg	Całe jaja w proszku NIST SRM8415	30
Mleko 10–20 µg	Mleko pełne w proszku NIST SRM8435	25,9
Orzech ziemny 25–50 µg	Masło orzechowe NIST SRM2387	22,2
Gluten 40 µg	Mąka zawierająca gluten (pochodzenia lokalnego)	~83
Soja 20–40 µg	Mąka sojowa (pochodzenia lokalnego)	~46,5
Migdał 20–40 µg	Migdał cały (pochodzenia lokalnego)	~19,5
Gryka 20–40 µg	Mąka gryczana (pochodzenia lokalnego)	~13

3M Clean-Trace test do detekcji alergenów może służyć do wykrywania pozostałości białek na powierzchniach oraz w roztworze, a tym samym określania, czy proces czyszczenia był skuteczny w kwestii usuwania białek z uwzględnieniem białek alergizujących. Interpretacja wyniku będzie jednak różna w zależności od konkretnego zastosowania, dlatego też zaleca się validację przez użytkowników metody pod kątem konkretnych wymagań.

⚠ Ostrzeżenia

Dodatkowe informacje oraz lokalne przepisy dotyczące utylizacji zawiera karta charakterystyki produktu.






⚠ Pouczenia

Białko jest powszechnie występującą substancją. Występuje na skórze, włosach i na wielu powierzchniach. Nie należy dotykać ani pałeczków do wymazów ani badanej powierzchni.

3M Clean-Trace testu do detekcji alergenów nie należy używać po przekroczeniu terminu ważności.

3M Clean-Trace test do detekcji alergenów umożliwia wykrywanie białek, a w związku z tym nie wykryje pozostałości produktów o niskiej zawartości białek lub niezawierających białka.

Pomimo, że 3M Clean-Trace test do detekcji alergenów jest bardzo czuły, konkretnej powierzchni nie można jednak uznać za wolną od alergenów na podstawie wyniku 3M Clean-Trace testu do detekcji alergenów.



Występują minimalne zakłócenia działania przez najczęściej stosowane środki odkażające w standardowych stężeniach. Wysokie stężenia zasadowych środków czyszczących mogą jednak w przypadku niektórych substancji powodować uzyskanie wyników fałszywie ujemnych. Środki odkażające na bazie nadtlenku wodoru mogą powodować fałszywie dodatni wynik reakcji zmiany koloru 3M Clean-Trace testu do detekcji alergenów.

Obowiązki Użytkownika

Użytkownicy są odpowiedzialni za zapoznanie się z instrukcjami oraz informacjami dotyczącymi produktu. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem www.3M.com/foodsafety lub zachęcamy do skontaktowania się z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem firmy 3M.

Przy wyborze metody testowania należy mieć na uwadze, że takie czynniki zewnętrzne, jak metody próbkowania, protokoły testowania, przygotowanie próbki, dalsze postępowanie i technika laboratoryjna mogą wpływać na uzyskiwane wyniki.

Obowiązkiem użytkownika przy wyborze jakiejkolwiek metody testowania lub produktu jest poddanie ocenie dostatecznej liczby próbek z właściwymi matrycami i z uwzględnieniem zagrożeń powodowanych przez mikroorganizmy, tak aby zastosowana metoda mogła spełnić oczekiwania użytkownika i ustalone przez niego kryteria.

Obowiązkiem użytkownika jest również dopilnować, aby zastosowane metody testowania i uzyskane wyniki spełniały wymagania klienta i dostawcy.

Tak jak w przypadku każdej metody testowania, wyniki uzyskiwane za pomocą produktu Bezpieczeństwa żywności 3M nie stanowią gwarancji jakości testowanych matryc lub procesów.

Wyłączenia Gwarancji / Ograniczone Środki Zaradcze

JEŚLI NIE ZOSTAŁO TO WYRAŻNIE OKREŚLONE W ROZDZIALE DOT. POJEDYNCZYCH OPAKOWAŃ PRODUKTÓW OGARNICZONEJ GWARANCJI, 3M WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSZYSTKICH GWARANCJI W SPOSÓB JAWNY ORAZ DOROZUMIANY, W TYM MIĘDZY INNYMI, DOWOLNYCH GWARANCJI ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Jeśli zostanie dowiedzione, że jakikolwiek produkt Bezpieczeństwa żywności 3M jest wadliwy, firma 3M lub jej autoryzowany dystrybutor wymieni lub, według uznania, zwróci koszty zakupu tego produktu. Są to jedyne przysługujące środki zaradcze. W ciągu 60 dni od wykrycia jakiejkolwiek podejrzewanej wady produktu należy niezwłocznie powiadomić firmę 3M oraz zwrócić produkt. W celu uzyskania informacji na temat procedury zwrotu towarów (RGA) należy skontaktować się z biurem obsługi klienta (1-800-328-1671 na terenie USA) lub z oficjalnym przedstawicielem ds. bezpieczeństwa żywności firmy 3M.

Ograniczenie Odpowiedzialności Firmy 3M

3M NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY, ZARÓWNO BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, UBOCZNE LUB NASTĘPCZE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI. W żadnym wypadku odpowiedzialność firmy 3M przyznana na mocy prawa nie może przekroczyć ceny zakupu produktu, wobec którego domniemywa się, że jest wadliwy.

Przechowywanie i utylizacja

W celu zapewnienia maksymalnego okresu trwałości test należy przechowywać w temp. w zakresie 2–25°C (36–77°F). Wymazówki zachowują również stabilność przez okres 14 dni pod warunkiem dostawy lub przechowywania w wyższej temperaturze; w przypadku tej opcji przechowywania nie należy przekraczać temp. 35°C (95°F). Data ważności i numer partii znajdują się na każdej z torebek. Po użyciu może zawierać mikroorganizmy, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie biologiczne. Należy postępować zgodnie z bieżącymi normami branżowymi dotyczącymi utylizacji.

Instrukcja użycia

Przed rozpoczęciem procedury testowej należy upewnić się, że kąpiel sucha, kąpiel wodna lub inkubator są uruchomione i ustawione na temp. 55°C (131°F).

1. 3M Clean-Trace test do detekcji alergenów należy przechowywać w temperaturze pokojowej przez okres co najmniej 10 minut przed użyciem. Ująć uchwyt pałeczkę próbki i wyjąć pałeczkę do wymazów z urządzenia. W przypadku suchych powierzchni należy zastosować dostarczony środek nawilżający i nanieść 4 krople na wymazówkę LUB nanieść 4 krople na badaną powierzchnię [rysunek 1].
2. Pobrać pałeczkę do wymazów materiał z badanego miejsca. Jeżeli pozwalały na to warunki, końcówką pałeczki do wymazów należy pobrać materiał z obszaru o wymiarach 10 cm na 10 cm, poruszając pałeczką do wymazów w jednym kierunku, a następnie w przeciwnym kierunku [rysunek 2]. Efektywne i powtarzalne pobieranie próbek wymaga dociskania i przekręcania pałeczki do wymazów podczas pobierania materiału [rysunek 3]. W celu dokonania kontroli roztworu należy zanurzyć wymazówkę w próbce i usunąć nadmiar płynu z bocznej części naczynia.

Uwaga: Test na obecność substancji sanitującej (np. badanie pH) w próbkach płynu w przypadku badania roztworu.

3. Ponownie wprowadzić pałeczkę próbki do testu przy uchwycie wprowadzonym do oryginalnego położenia niewykorzystanego testu. Na tym etapie można dokonać natychmiastowej aktywacji i odczytu lub, jeśli jest to bardziej wygodne, 3M Clean-Trace test do detekcji alergenów można oznaczyć i pozostawić w stanie nieaktywnym przez okres do czterech godzin przed aktywacją i zbadaniem wielu wymazówek jednocześnie.
4. Aby poddać próbkę obróbce, należy mocno wcisnąć górną część uchwytu pałeczki próbki 3M Clean-Trace testu do detekcji alergenów [rysunek 4]. Uchwyt wsuwa się do urządzenia, a górna część uchwytu po całkowitym wciśnięciu w gniazdo powinna znajdować się na tym samym poziomie co górna część rurki urządzenia. Ujętą górną część urządzenia testowego i potrząsać szybko na boki przez minimum pięć sekund, aby wymieszać próbkę z reagentem [rysunek 5]. Kolor roztworu zmieni się na miętowy.
5. Umieścić 3M Clean-Trace test do detekcji alergenów w bloku grzejnym wstępnie ogrzewanym do temp. 55°C (131°F). Ogrzewać przez 15 minut w temp. 55°C (131°F). Porównać kolor wymazówki i roztworu z etykietą 3M Clean-Trace testu do detekcji alergenów. Jako końcowy wynik testu należy zanotować najbardziej intensywną zmianę koloru w roztworze lub na wymazówce.

W jaki sposób można najlepiej wykorzystać 3M Clean-Trace test do detekcji alergenów na powierzchni	
Należy	Nie wolno
Przytrzymać 3M Clean-Trace test do detekcji alergenów w położeniu PIONOWYM podczas aktywowania i szybko potrząsać nim Z BOKU NA BOK przez co najmniej 5 sekund.	Aktywować test, trzymając go w pozycji innej niż pionowa, nie wstrząsać w góre ani w dół, nie wstrząsać agresywnie.
Inkubować 3M Clean-Trace test do detekcji alergenów w pozycji pionowej.	Inkubować 3M Clean-Trace test do detekcji alergenów w pozycji poziomej.
Odczytać wynik 3M Clean-Trace testu do detekcji alergenów po upływie 15 minut.	Odnosować jakichkolwiek zmian po upływie 15 minut.

Interpretacja wyników

Kolor reakcji testu wskaże poziom pozostałości białek na powierzchni. Oceny czystości powierzchni można dokonać przez porównanie powstałego koloru z etykietą 3M Clean-Trace testu do detekcji alergenów.

- Kolor zielony wskazuje wynik pomyślny — powierzchnia czysta, brak konieczności dalszych działań.
- Kolor szary oznacza wynik nierostrzygnięty — zaleca się ponowne wyczyszczenie i przeprowadzenie testu.
- Kolor fioletowy wskazuje na wynik niepomyślny — wyczyścić i zbadać ponownie.

Podczas ogrzewania kolor miętowy blednie i staje się przezroczysty o niebieskim zabarwieniu w przypadku próbek ujemnych; podczas schładzania kolor zielony jest przywracany na krótką chwilę po wyjęciu z bloku grzejnego. W celu zapewnienia pomocy w interpretacji zaleca się porównanie kontroli ujemnej.

Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z działem technicznym 3M Food Safety.

Objaśnienie symboli

www.3M.com/foodsafety/symbols

3M Food Safety

3M United States

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-800-328-6553

3M Canada

Post Office Box 5757
London, Ontario N6A 4T1
Canada
1-800-563-2921

3M Latin America

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-954-340-8263

3M Europe and MEA

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Strasse 1
D41453 Neuss/Germany
+49-2131-14-3000

3M United Kingdom PLC

Morley Street, Loughborough
Leicestershire
LE11 1EP
United Kingdom
+(44) 1509 611 611

3M Österreich GmbH

Euro Plaza
Gebaude J, A-1120 Wien
Kranichberggasse 4
Austria
+(43) 1 86 686-0

3M Asia Pacific

No 1, Yishun Avenue 7
Singapore, 768923
65-64508869

3M Japan

3M Health Care Limited
6-7-29, Kita-Shinagawa
Shinagawa-ku, Tokyo
141-8684 Japan
81-570-011-321

3M Australia

Bldg A, 1 Rivett Road
North Ryde, NSW 2113
Australia
611300 363 878



3M Health Care

2510 Conway Ave
St. Paul, MN 55144 USA
www.3M.com/foodsafety

© 2017, 3M. All rights reserved.
3M is a trademark of 3M. Used under license in Canada.
34-8721-8852-8



Clean-Trace™



(Magyar)



Kibocsátás dátuma: 2017-10

Termékhhasználati útmutató

Felszíni Fehérje Allergén Teszt

Termékleírás és szándékolt felhasználás

A 3M™ Clean-Trace™ Felszíni Fehérje Allergén Teszt alapját a biuret-reakció képezi. Lúgos közegben a réz(II)-ionok (Cu^{2+}) komplexet képeznek a fehérjék peptidlkötéseihez, réz(I)-ionná (Cu^+) redukálódnak. A lúgos közegben a bicinkoninil sav (BCA) rendkívül nagy érzékenységű, stabil és specifikus reagens, amely lila komplexet képez Cu^+ ionokkal. A teszt színváltozás alapján ad becslést a fehérjetartalomra. A 3M Clean-Trace Fehérje Allergén Teszt egy érzékeny fehérjekimutató kenetmintavező, amelynek a kimutatási küszöbe 3 µg teljes fehérje (marhaszérum-albumin kontrollal). Az abszolút korlát változhat a tesztelt minta fehérje-összetételétől függően. A felületek, eszközök és öblítőoldatok vizsgálatával kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a lerakódásban keveredhetnek az allergén és a nem allergén fehérjék, valamint a nem fehérje anyagok egyaránt.

Az eredmények kiértékelésével kapcsolatos segítségekért a 3M saját tesztjei szerint a pozitív eredményt adó 3M Clean-Trace Fehérje Allergén Teszt a következő minimális allergénmennyiségre utalhat:

Referenciaanyag

Allergénkimutatási határ	Felhasznált anyag	Fehérjetartalom (%)
Tojás 10–20 µg	NIST SRM8415 Tojáspor (egész tojásból)	30
Tej 10–20 µg	NIST SRM8435 Tejpor teljes tejből	25,9
Mogyoró 25–50 µg	NIST SRM2387 Mogyoróvaj	22,2
Glutén 40 µg	Gluténes liszt (helyi forrásból)	~83
Szója 20–40 µg	Szójaliszt (helyi forrásból)	~46,5
Mandula 20–40 µg	Mandula egészben (helyi forrásból)	~19,5
Hajdina 20–40 µg	Hajdinaliszt (helyi forrásból)	~13

A 3M Clean-Trace Fehérje Allergén Teszt alkalmás felületek és oldatok fehérjemaradványainak kimutatására, és ezen keresztül képes meghatározni, hogy adott tisztítási eljárás sikeresen eltávolította-e a fehérjéket, köztük a potenciálisan allergén tulajdonságúkat. Ugyanakkor az eredmények kiértékelése változhat az adott alkalmazástól függően, ezért a felhasználók számára ajánlott a saját igényeiknek megfelelő módszert alkalmazni.

⚠ Figyelmeztetések

A további információkat és az ártalmatlanítással kapcsolatos helyi rendelkezéseket illetően tekintse át a biztonsági adatlapot.

⚠ Figyelmeztetések






A fehérje gyakran előforduló anyag. Bőrön, hajon és sok más felszínen megtalálható. Ne érintse meg a kenetmintavezőt és a vizsgálandó felületet.

Ne használja a 3M Clean-Trace Fehérje Allergén Teszt eszközt annak lejáratú dátumát követően.

A 3M Clean-Trace Fehérje Allergén Teszt a fehérjéket mutatja ki, ezért nem alkalmás olyan termékmaradványok észleléssére, amelyek fehérjetartalma alacsony vagy nulla.

Noha a 3M Clean-Trace Fehérje Allergén Teszt érzékenysége magas, adott felület nem tekinthető allergénmentesnek a 3M Clean-Trace Fehérje Allergén Teszt eredménye alapján.

Minimális mértékű interferencia fordulhat elő a széles körben használt, normál koncentrációban alkalmazott fertőtlenítőszerekkel. Ugyanakkor bizonyos esetekben a nagy koncentrációjú, lúgos tisztítószerek okozhatnak hamis negatív eredményt. A peroxidálapú fertőtlenítőszerek hamis pozitív színváltozási reakciót válthatnak ki a 3M Clean-Trace Fehérje Allergén Teszt esetében.



A Felhasználó Felelőssége

A felhasználók kötelesek megismerni a termék használati útmutatójával és tájékoztatójával. További tájékoztatásért látogassa meg a www.3M.com/foodsafety honlapot, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi 3M képviselővel vagy forgalmazóval.

A tesztelési eljárás kiválasztásakor tudatában kell legyünk, hogy egyes külső tényezők, mint pl. a mintavételi módszerek, tesztelési protokollok, minta-előkészítés, kezelés, és laboratóriumi technikák befolyásolhatják az eredményt.

A felhasználó felelőssége, hogy a kiválasztott metódusnál elégséges mintaszám, megfelelő mátrixok és mikrobiális vizsgálatok megválasztása által a választott tesztelési módszer eleget tegyen a felhasználó elvárásainak.

A felhasználó felelőssége továbbá annak meghatározása, hogy a tesztelési módszerek és eredmények megfelelnek-e az ügyfél és a szállító elvárásainak.

Más tesztelési módszerekhez hasonlóan, a 3M Élelmiszer-biztonsági termékeknek használata során nyert eredmények sem nyújtanak garanciát a tesztelt mátrixok vagy eljárások minőségére vonatkozóan.

A Szavatosság Korlátozása / Korlátozott Jogorvoslat

AZ ADOTT TERMÉKCSOMAGOLÁS KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEIBEN KIFEJEZETTEN ELŐÍRTAK KIVÉTELÉVEL, A 3M CÉG KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT ÉS HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALMAZHATÓSÁGRA, VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT. Amennyiben bármely 3M Élelmiszer-biztonsági termék hibásnak bizonyulna, a 3M cég vagy annak meghatalmazott forgalmazója – saját döntése szerint – az adott terméket kicseréli vagy a vételárat visszatéríti az ügyfélnek. Egyéb jogorvoslatnak nincs helye. Ha bármely terméknél felmerül a hiba gyanúja, lehetőleg azonnal, de legfeljebb hatvan napon belül értesítenie kell a 3M-et, és vissza kell juttatnia a terméket a 3M-nek. A cserejog érvényesítéséhez hívja fel az ügyfélszolgálatot (az Amerikai Egyesült Államokban az 1-800-328-1671 telefonszámon) vagy a 3M Food Safety divízió hivatalos helyi képviselőjét.

A 3M Felelősségének Korlátozása

A 3M NEM TAROZIK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, SPECIÁLIS, KÖVETKEZMÉNYES VAGY VÉLETLENSZERŰ VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELMARADT HASZNÓT IS. A 3M cég felelősségének mértéke semmilyen jogelv szerint nem haladhatja meg a hibásnak mondott termék vételárát.

Tárolás és selejtezés

A maximális eltarthatóság érdekében tárolja 2–25 °C hőmérsékleten. A kenetmintavezők magasabb hőmérsékleten történő szállítás vagy tárolás esetén 14 napig stabilak, ezért a tárolási hőmérséklet nem haladhatja meg a 35 °C-ot. A lejáratú dátum és a téteszám minden tasakon megtalálható. Használat után mikroorganizmusokat tartalmazhat, mely potenciális veszélyt jelenthet. Az ártalmatlanításkor kövesse a hatályos ipari szabványokat.

Használati utasítás

A tesztfolyamat megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a szárazfürdő, a vízfürdő, illetve az inkubátor be van kapcsolva, és 55 °C-ra van állítva.

1. Használat előtt a 3M Clean-Trace Fehérje Allergén Teszt eszközt legalább 10 percre helyezze szobahőmérsékletű környezetbe. Fogja szorosan a mintavételi pálcát és húzza ki a kenetmintavezőt az eszközöből. Száraz felületeken használja a mellékelt nedvesítőt, és vigyen fel 4 cseppet a kenetmintavezőre, VAGY 4 cseppet a tesztelni kívánt felületre [1. ábra].
2. Vegyen kenetet a vizsgálandó területről. Lehetőleg 10 cm × 10 cm-es területről vegyen kenetet, és a mintavételkor haladjon egy irányba, majd az ellenkező irányba [2. ábra]. A mintavétel során nyomja a felületre, és forgassa a kenetmintavezőt az ismételhető és hatékony mintavétel érdekében [3. ábra]. Valamely oldat teszteléséhez merítse a kenetmintavezőt a mintába, majd távolítsa el a fölösleges folyadékot az edény oldalán.

Megjegyzés: Oldat vizsgálatakor végezzen próbát a folyadékmintákon arra vonatkozóan, hogy van-e jelen fertőlenítőszerek (pl. pH-méréssel).

3. Helyezze vissza a mintavételi pálcát a tesztelőeszközbe úgy, hogy a pálca nyele ismét az eredeti helyzetébe kerüljön. Ekkor lehetősége van aktiválni az eszközt és azonnal elvégezni a mérést, illetve – ha úgy előnyösebb – a 3M Clean-Trace Fehérje Allergén Teszt eszközt fel is címkezheti, és akár négy órán keresztül is aktiválatlanul hagyhatja, majd egyszerre több kenetmintavezővel hajthatja végre a mérést.

4. A minta feldolgozásához erőteljesen nyomja lefelé a 3M Clean-Trace Fehérje Allergén Teszt mintavételi pálcája nyelének tetejét [4. ábra]. A nyél az eszköz csövébe csúszik, és teljes lenyomás esetén a nyél teteje az eszköz tetejével egy magasságba kerül. Fogja szorosan az eszköz tetejét, és rázza gyorsan oldalirányban legalább öt másodpercen keresztül, hogy a minta és a reagens összekeveredjen [5. ábra]. Az oldat mentazöld színűvé válik.
5. Helyezze a 3M Clean-Trace Fehérje Allergén Teszt eszközt 55 °C-ra előmelegített fűtőblokkba. Melegítse 15 percen keresztül 55 °C-on. Vesse össze a kenetmintavező és az oldat színét a 3M Clean-Trace Fehérje Allergén Teszt címkéjén látható színskálával. Végeredményként a legjelentősebb színváltozást jegyezze föl – akár az oldatban, akár a kenetmintavezőn jelentkezik.

A 3M Clean-Trace Felszíni Fehérje Allergén Teszt leghatékonyabb felhasználása	
Tegye az alábbiakat	Ne tegye az alábbiakat
A 3M Clean-Trace Fehérje Allergén Teszt eszközt tartsa FÜGGÖLEGES helyzetben aktiváláskor, és legalább 5 másodpercig rázza gyorsan OLDALIRÁNYBAN.	Ne aktiválja, ha nincs függőleges helyzetben, ne rázza függőleges irányban, ne rázza túl vadul.
A 3M Clean-Trace Fehérje Allergén Teszt inkubálását az eszközt függőlegesen tartva végezze.	A 3M Clean-Trace Fehérje Allergén Teszt inkubálását ne vízszintes helyzetben tartott eszközzel végezze.
A 3M Clean-Trace Fehérje Allergén Teszt eredményét 15 perc elteltével értékelje ki.	Ne jegyezze fel a 15 percert meghaladóan jelentkező színváltozásokat.

Értelmezés

A tesztreakció színe jelzi a fehérjearadványok mennyiségét a felületen. A kialakult színt a 3M Clean-Trace Fehérje Allergén Teszt címkéjén látható színmintákkal összevetve becslés adható a felület tisztaságára vonatkozóan.

- A zöld szín a „Megfelelt” eredmény. – Tiszta, további intézkedés nem szükséges.
- A szürke szín nem egyértelmű eredményt jelez. – Újból tisztítás és újriratesztelés javasolt.
- A lila szín az „Elégtelen” eredmény. – Újból tisztítás és újriratesztelés szükséges.

Melegítéskor a mentazöld szín elhalványul, és átlátszóvá válik kékes árnyalattal a negatív minták esetében; a zöld szín az oldat kihűléssével hamar visszatér a fűtőblokkból történő eltávolítást követően. A kiértékelés támogatása érdekében negatív kontrollmintával történő összevetés javasolt.

További információért vegye fel a kapcsolatot a 3M Food Safety technikai ügyfélszolgálatával.

Szimbólummagyarázat

www.3M.com/foodsafety/symbols

3M Food Safety

3M United States

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-800-328-6553

3M Canada

Post Office Box 5757
London, Ontario N6A 4T1
Canada
1-800-563-2921

3M Latin America

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-954-340-8263

3M Europe and MEA

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Strasse 1
D41453 Neuss/Germany
+49-2131-14-3000

3M United Kingdom PLC

Morley Street, Loughborough
Leicestershire
LE11 1EP
United Kingdom
+(44) 1509 611 611

3M Österreich GmbH

Euro Plaza
Gebaude J, A-1120 Wien
Kranichberggasse 4
Austria
+(43) 1 86 686-0

3M Asia Pacific

No 1, Yishun Avenue 7
Singapore, 768923
65-64508869

3M Japan

3M Health Care Limited
6-7-29, Kita-Shinagawa
Shinagawa-ku, Tokyo
141-8684 Japan
81-570-011-321

3M Australia

Bldg A, 1 Rivett Road
North Ryde, NSW 2113
Australia
611300 363 878



3M Health Care

2510 Conway Ave
St. Paul, MN 55144 USA
www.3M.com/foodsafety

© 2017, 3M. All rights reserved.
3M is a trademark of 3M. Used under license in Canada.
34-8721-8852-8



Clean-Trace™

Pokyny k výrobku

Alergenový test Povrchový protein

Popis výrobku a určený účel použití

Alergenový test 3M™ Clean-Trace™ Povrchový protein je založený na biuretové reakci. Za alkalických podmínek mědnaté ionty (Cu^{2+}) tvoří komplex s peptidovými vazbami proteinu a redukují se na Cu^+ . Kyselina bicinchoninová (BCA) je za alkalických podmínek vysoce citlivé, stabilní a specifické činidlo, které vytváří purpurový komplex s Cu^+ . Test poskytuje odhad výskytu proteinů prostřednictvím změny barvy. Alergenový test 3M Clean-Trace Povrchový protein je tampon pro citlivou detekci proteinů s mezí detekce přibližně 3 µg celkového množství proteinu (s použitím hovězího sérového albuminu jako kontroly). Absolutní mez se bude lišit v závislosti na proteinovém složení testovaných vzorků. Když testujete povrhy, zařízení a oplachovací roztoky, je důležité si uvědomit, že zbytky mohou obsahovat směs alergenních a nealergenních proteinů, a rovněž neproteinové materiály.

Určitou orientační pomůckou pro interpretaci výsledků může být, že testování ve společnosti 3M ukázalo, že pozitivní výsledek alergenového testu 3M Clean-Trace Protein by se mohl rovnat přítomnosti následujících přibližných minimálních množství alergenních produktů:

Referenční materiál

Mez detekce alergenů	Použitý materiál	Obsah proteinů (%)
Vejce 10–20 µg	NIST SRM 8415 Celá vejce v prášku	30
Mléko 10–20 µg	NIST SRM 8435 Sušené plnotučné mléko	25,9
Arašídy 25–50 µg	NIST SRM 2387 Arašídové máslo	22,2
Lepek 40 µg	Lepková mouka (z místních zdrojů)	~83
Sója 20–40 µg	Sójová mouka (z místních zdrojů)	~46,5
Mandle 20–40 µg	Celé mandle (z místních zdrojů)	~19,5
Pohanka 20–40 µg	Pohanková mouka (z místních zdrojů)	~13

Alergenový test 3M Clean-Trace Protein lze použít k detekci zbytků proteinů na površích a v roztoku, a tím k určení, zda bylo čištění účinné, co se týče odstranění proteinů, včetně potenciálně alergenných proteinů. Ale interpretace výsledků se bude lišit v závislosti na konkrétní aplikaci, takže doporučujeme, aby uživatelé metodu validovali pro své konkrétní požadavky.

⚠️ Varování

Další informace a místní předpisy pro likvidaci vyhledejte v bezpečnostním listu.

⚠️ Výstrahy






Protein je běžná látka, která je přítomná na kůži, na vlasech a na mnoha dalších površích. Proto se nedotýkejte ani tamponu, ani posuzované plochy.

Nepoužívejte alergenový test 3M Clean-Trace Protein po datu exspirace.

Alergenový test 3M Clean-Trace Protein detekuje protein, a tak nebude detekovat přítomné zbytky produktů s nízkým nebo nulovým obsahem proteinů.

I když je alergenový test 3M Clean-Trace Protein velmi citlivý, povrch nelze považovat za povrch bez alergenů na základě výsledku alergenového testu 3M Clean-Trace Protein.

U nejběžnějších čisticích prostředků používaných při normálních koncentracích dochází k minimální interferenci s výsledky testu. Avšak vysoké koncentrace alkalických čisticích prostředků mohou v některých případech způsobovat falešně negativní výsledky. Dezinfekční prostředky na bázi peroxidu mohou způsobit falešně pozitivní změnu barvy alergenového testu 3M Clean-Trace Protein.



Odpovědnost Uživatele

Uživatelé jsou povinni se seznámit s pokyny k výrobku a informacemi o něm. Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách www.3M.com/foodsafety nebo se obraťte na svého místního zástupce společnosti 3M či místního distributora.

Při volbě metody testu je nutné vzít v úvahu možný vliv externích faktorů, například odběrových metod, protokolu testu, přípravy vzorku, manipulace a postupu při přípravě v laboratoři; to vše může ovlivnit výsledky.

Uživatel odpovídá za volbu vhodné metody testu či testovacího produktu a posouzení dostatečného počtu vzorků v porovnání s příslušnými tabulkami a typy mikrobů tak, aby test splnil jeho kritéria.

Uživatel také musí sám posoudit, jaké testovací metody a výsledky splňují požadavky jeho zákazníků a dodavatelů.

Stejně jako u jakýchkoliv testovacích metod, ani výsledky získané pomocí jakéhokoliv výrobku společnosti 3M Food Safety nezaručují kvalitu testovaných vzorků a procesů.

Omezení Záruky/Omezení Náhrady Škody

NENÍ-LI VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK V ČÁSTI O OMEZENÉ ZÁRUCE NA BALENÍ JEDNOTLIVÝCH PRODUKTŮ, NENESE SPOLEČNOST 3M ŽÁDNOU VÝSLOVNU ANI IMPLICITNÍ ZÁRUKU, VČETNĚ NAPŘÍKLAD JAKÉKOLIV ZÁRUKY PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU. Pokud je výrobek společnosti 3M Food Safety vadný, společnost 3M nebo její autorizovaný distributor dle vlastního rozhodnutí vymění nebo vrátí kupní cenu produktu. Jiné opravné prostředky společnost neposkytuje. Jakoukoliv předpokládanou vadu v produktu musíte okamžitě oznámit společnosti 3M do 60 dnů od zjištění a produkt musíte vrátit společnosti 3M. Chcete-li získat autorizaci vráceného zboží, obraťte se telefonicky na podporu pro zákazníky (1-800-328-1671 v USA) nebo na místního oficiálního zástupce společnosti 3M Food Safety.

Omezení Odpovědnosti Společnosti 3M

SPOLEČNOST 3M NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNOU ZTRÁTU ANI PŘÍMOU, NEPŘÍMOU, SPECIÁLNÍ, NÁHODNOU NEBO NÁSLEDNOU ŠKODU, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZTRÁTY ZISKU. Odpovědnost společnosti 3M v žádném případě dle žádné právní teorie nepřekročí kupní cenu produktu, u něhož je uplatňována vada.

Skladování a likvidace

Pro dosažení maximální skladovací doby test skladujte při teplotách 2–25 °C (36–77 °F). Případně jsou tampony stabilní po dobu 14 dnů, jestliže se dodávají nebo skladují při zvýšené teplotě. V takovém případě nesmí teplota překročit 35 °C (95 °F). Doba použitelnosti a číslo šarže jsou uvedeny na sáčku. Po použití může obsahovat mikroorganismy, jež mohou představovat potenciální biologické nebezpečí. Při likvidaci dodržujte platné oborové normy.

Návod k použití

Před zahájením testování se ujistěte, že suchá lázeň, vodní lázeň nebo inkubátor jsou zapnuté a nastavené na 55 °C (131 °F).

1. Před použitím umístěte alergenový test 3M Clean-Trace Protein na dobu nejméně 10 minut na místo s pokojovou teplotou. Uchopte držátko odběrové tyčinky a vytáhněte tampón z prostředku. Na suchých površích použijte dodaný zvlhčovač a naneste 4 kapky na tampon NEBO naneste 4 kapky na kontrolovaný povrch [obr. 1].
2. Otřete tampónem kontrolovanou oblast. Stíraná plocha by měla mít pokud možno velikost 10 × 10 cm, přičemž se stírá vždy nejprve v jednom směru a potom v opačném směru [obr. 2]. K zajištění reprodukovatelného a účinného odběru vzorku působte na tampon při stírání tlakem a během stírání jím otáčejete [obr. 3]. Chcete-li testovat roztok, ponořte tampon do vzorku a veškerou přebytečnou tekutinu odstraňte po straně nádoby.

Poznámka: Jestliže testujete roztok, testujte na přítomnost dezinfekčního činidla (např. kontrola pH) ve vzorcích tekutin.

3. Zasuňte odběrovou tyčinku zpět do testu tak, aby držátko bylo v původní poloze jako u nepoužitého testu. V tomto okamžiku můžete buď okamžitě provést aktivaci a změřit výsledek, nebo, pokud je to vhodné, lze alergenový test 3M Clean-Trace Protein označit štítkem a ponechat neaktivovaný po dobu maximálně čtyř hodin, než provedete aktivaci a měření několika tamponů současně.
4. Chcete-li vzorek zpracovat, pevně zatlačte na horní konec držátko odběrové tyčinky alergenového testu 3M Clean-Trace Protein [obr. 4]. Držátko sklouzne do zkumavky a jeho vršek musí být po úplném zatlačení na úrovni horního okraje zkumavky. Uchopte prostředek v horní části a prudkým třepáním ze strany na stranu po dobu alespoň pěti vteřin smíchejte vzorek s činidlem [obr. 5]. Roztok změní barvu na mátově zelenou.
5. Umístěte alergenový test 3M Clean-Trace Protein do ohřívacího bloku, který jste předehráli na 55 °C (131 °F). Ohřívejte po dobu 15 minut při teplotě 55 °C (131 °F). Porovnejte barvu tamponu a roztoku se štítkem alergenového testu 3M Clean-Trace Protein. Zaznamenejte nejvýraznější změnu barvy v roztoku nebo na tamponu jako konečný výsledek.

Jak nejlépe používat alergenový test 3M Clean-Trace Povrchový protein	
Co dělat	Co nedělat
Držte alergenový test 3M Clean-Trace Protein po aktivaci ve SVISLÉ poloze a po dobu alespoň 5 sekund jím rychle třepejte ZE STRANY NA STRANU.	Neaktivujte v jiné než svislé poloze, netřepejte pohybem nahoru–dolů, netřepejte agresivně.
Inkubujte alergenový test 3M Clean-Trace Protein ve svislé poloze.	Neinkubujte alergenový test 3M Clean-Trace Protein ve vodorovné poloze.
Proveděte odečet alergenového testu 3M Clean-Trace Protein přesně po 15 minutách.	Neberte v potaz jakoukoli změnu barvy po více než 15 minutách.

Interpretace

Barva testu bude udávat úroveň zbytků proteinů na daném povrchu. Porovnáním vyprodukované barvy se štítkem alergenového testu 3M Clean-Trace Protein lze provést odhad čistoty povrchu.

- Zelená znamená výsledek Splňuje požadavky – čistý, nejsou nutná žádná další opatření.
- Šedá je neprůkazný výsledek – doporučujeme opakovat čištění a test.
- Purpurová znamená výsledek Nesplňuje požadavky – opakovat čištění a test.

Při zahřívání se mátově zelená barva ztrácí a stává se čirou s modrým zabarvením u negativních vzorků. Zelená barva se vrací při ochlazování krátce po vyjmutí z ohřívacího bloku. Jako pomůcku při interpretaci doporučujeme porovnání s negativní kontrolou.

Bližší informace si můžete vyžádat od útvaru technických služeb společnosti 3M Food Safety.

Vysvětlení symbolů

www.3M.com/foodsafety/symbols

3M Food Safety

3M United States

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-800-328-6553

3M Canada

Post Office Box 5757
London, Ontario N6A 4T1
Canada
1-800-563-2921

3M Latin America

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-954-340-8263

3M Europe and MEA

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Strasse 1
D41453 Neuss/Germany
+49-2131-14-3000

3M United Kingdom PLC

Morley Street, Loughborough
Leicestershire
LE11 1EP
United Kingdom
+(44) 1509 611 611

3M Österreich GmbH

Euro Plaza
Gebaude J, A-1120 Wien
Kranichberggasse 4
Austria
+(43) 1 86 686-0

3M Asia Pacific

No 1, Yishun Avenue 7
Singapore, 768923
65-64508869

3M Japan

3M Health Care Limited
6-7-29, Kita-Shinagawa
Shinagawa-ku, Tokyo
141-8684 Japan
81-570-011-321

3M Australia

Bldg A, 1 Rivett Road
North Ryde, NSW 2113
Australia
611300 363 878



3M Health Care

2510 Conway Ave
St. Paul, MN 55144 USA
www.3M.com/foodsafety

© 2017, 3M. All rights reserved.
3M is a trademark of 3M. Used under license in Canada.
34-8721-8852-8

Clean-Trace™

Instrucțiuni despre produs

Proteine de suprafață Test alergenic

Descrierea produsului și domeniul de utilizare

3M™ Clean-Trace™ Proteine de suprafață Test alergenic se bazează pe reacția Biuret. În condiții alcaline, ionii de cupru (Cu^{2+}) formează un complex cu legături peptidice de proteină și se reduce la Cu^+ . În mediu alcalin, acidul bicinchoninic (BCA) este un reactiv cu grad ridicat de sensibilitate, stabil și specific, care formează un complex violet cu Cu^+ . Testul oferă o estimare a proteinelor prin intermediul unei schimbări de culoare. 3M Clean-Trace Proteine Test alergenic este un tampon sensibil pentru detectarea proteinelor, cu o limită de detectare de aproximativ 3 µg din proteinele totale (folosind Albumină serică bovină drept control). Limita absolută va varia în funcție de compoziția proteinelor din mostrele testate. Când se testează suprafețe, echipamente și soluții de clătire, este important să rețineți că reziduurile pot conține un amestec de proteine alergenice și non-alergenice, precum și materiale neproteice.

Pentru a oferi îndrumare cu privire la interpretarea rezultatelor, testele realizate de 3M au indicat că un rezultat pozitiv al 3M Clean-Trace Proteine Test alergenic poate echivala cu prezența următoarelor cantități aproximative minime de produse alergenice:

Material de referință

Limită detectare alergeni	Material utilizat	Conținut de proteină (%)
Ou 10-20 µg	NIST SRM8415 Pudră integrală de ou	30
Lapte 10-20 µg	NIST SRM8435 Lapte praf integral	25,9
Alune 25-50 µg	NIST SRM2387 Unt de arahide	22,2
Gluten 40 µg	Făină cu gluten (din surse locale)	~83
Soia 20-40 µg	Făină de soia (din surse locale)	~46,5
Migdale 20-40 µg	Migdale integrale (din surse locale)	~19,5
Hrișcă 20-40 µg	Făină de hrișcă (din surse locale)	~13

3M Clean-Trace Proteine Test alergenic poate fi folosit pentru a detecta reziduurile de proteină de pe suprafețe și din soluții și, prin urmare, pentru a stabili dacă s-a făcut curățenie eficient în ceea ce privește eliminarea proteinelor, inclusiv eliminarea proteinelor cu potențial alergenic. Cu toate acestea, interpretarea rezultatelor variază în funcție de aplicația specifică, astfel încât se recomandă ca utilizatorii să valideze metoda pentru cerințe specifice.

⚠️ Avertismente

Consultați Fișa tehnică de siguranță pentru informații suplimentare și reglementări locale privind eliminarea deșeurilor.






⚠️ Atenționări

Proteina este o substanță comună. Este prezentă pe piele, pe păr și pe numeroase suprafețe. Nu atingeți tamponul de prelevare și nici suprafața ce trebuie testată.

Nu folosiți 3M Clean-Trace Proteine Test alergenic după data expirării.

3M Clean-Trace Proteine Test alergenic detectează proteină și, astfel, nu detectează reziduurile produselor cu un conținut de proteină scăzut sau zero.

Deși 3M Clean-Trace Proteine Test alergenic este foarte sensibil, o suprafață nu poate fi considerată a nu prezenta alergeni pe baza rezultatului unui astfel de test.





La concentrații normale ale celor mai obișnuiți dezinfectanți, interferențele sunt minime. Cu toate acestea, concentrațiile ridicate de agenți de curățare alcalini pot cauza rezultate negative false în anumite situații. Dezinfectanții pe bază de peroxid pot genera o reacție falsă pozitivă de schimbare a colorii în cazul 3M Clean-Trace Proteine Test alergenic.

Responsabilitatea Utilizatorului

Utilizatorii sunt responsabili să se familiarizeze cu instrucțiunile produsului și cu informațiile despre produs. Vizitați pagina noastră de Internet la www.3M.com/foodsafety, sau contactați reprezentantul sau distribuitorul dvs. local 3M pentru mai multe informații.

În momentul selectării unei metode de testare, este important să rețineți faptul că factorii externi, cum ar fi metodele de prelevare a probelor, protocoalele de testare, prepararea și manipularea mostrelor, precum și tehniciile de laborator pot influența rezultatele testelor.

Este responsabilitatea utilizatorului să selecteze orice metodă de testare sau produs în vederea evaluării unui număr suficient de probe, cu matricele corespunzătoare și condițiile microbiene adecvate, astfel încât metoda de testare aleasă să corespundă criteriilor sale.

Este, de asemenea, responsabilitatea utilizatorului să se asigure că toate metodele de testare și rezultatele acestora satisfac cerințele clientilor și ale furnizorilor săi.

Ca în cazul oricărei metode de testare, rezultatele obținute în urma utilizării oricărui produs 3M Food Safety (Siguranța alimentară) nu constituie o garanție a calității matricelor sau a proceselor supuse testării.

Limitarea Garanției / Despăgubire Limitată

CU EXCEPTIA CELOR MENTIONATE ÎN MOD EXPRES ÎN SECȚIUNEA PRIVIND GARANȚIA LIMITATĂ A AMBALAJELOR PRODUSELOR INDIVIDUALE, 3M NU RECUNOAȘTE NICIO GARANȚIE EXPRESĂ ȘI IMPLICITĂ, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, ORICE GARANȚII DE VANDABILITATE SAU DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Dacă orice produs 3M Food Safety (Siguranța alimentară) este defect, 3M sau distribuitorul său autorizat, la alegerea sa, va înlocui sau va returna prețul de achiziție al produsului. Acestea sunt singurele măsuri ce se pot lua. Trebuie să întăriți imediat 3M în termen de șaizeci de zile de la descoperirea oricărora defecte suspecte ale produsului și să returnați produsul la 3M. Apelați Serviciul de asistență clienti (021.202.8000 în România) sau reprezentantul dvs. oficial 3M Food Safety pentru a obține o autorizație de înapoiere a bunurilor.

Limitarea Răspunderii 3M

3M NU VA FI RESPONSABIL PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI SAU DAUNE, FIE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, ACCIDENTALE SAU DAUNE DE CONSECINȚĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, PIERDERI DE PROFIT. În niciun caz răspunderea 3M nu va depăși sub nicio ipoteză legală prețul de achiziție al produsului bănuit a fi defect.

Depozitarea și eliminarea

Pentru termen de valabilitate maxim, depozitați între 2 și 25 °C. Ca o alternativă, tampoanele sunt stabile timp de 14 zile când sunt transportate sau depozitate la temperatură ridicată; în cazul acestei opțiuni de depozitare, temperatura nu trebuie să depășească 35 °C. Data expirării și numărul lotului sunt imprimate pe fiecare pungă. După utilizare, dispozitivul poate conține microorganisme care prezintă potențial de risc biologic. Pentru eliminare, respectați standardele industriale curente.

Instrucțiuni de utilizare

Înainte de a începe procedura de test, asigurați-vă că baia uscată, baia cu apă sau incubatorul sunt pornite și sunt setate la 55 °C.

1. Țineți 3M Clean-Trace Proteine Test alergenic la temperatura camerei timp de cel puțin 10 minute înainte de utilizare. Prindeți mânerul sondei de prelevare a probelor și scoateți tamponul de prelevare din dispozitiv. Pentru suprafețe uscate, folosiți agentul de hidratare furnizat și aplicați 4 picături pe tampon SAU aplicați 4 picături pe suprafața de testat [figura 1].
2. Tamponați zona de testare. Dacă este posibil, tamponați o zonă de aproximativ 10 cm pe 10 cm într-o direcție, apoi tamponați zona respectivă în direcția opusă [figura 2]. Aplicați presiune asupra tamponului și roțiți-l în timpul prelevării probei pentru a asigura o prelevare repetabilă și eficientă [figura 3]. Pentru a testa o soluție, scufundați tamponul în moștră și îndepărtați excesul de lichid pe partea laterală a vasului.

Notă: Testați existența agentului dezinfectant (de exemplu, test pH) în mostrele de lichid dacă este testată o soluție.



3. Reintroduceți sonda de prelevare în test cu mânerul introdus în poziția originală a testului neutilizat. În acest moment, puteți activa și măsura imediat sau, dacă este mai convenabil, 3M Clean-Trace Proteine Test alergenic poate fi etichetat și lăsat neactivat până la patru ore înainte de activare și de citirea simultană a valorilor mai multor tampoane.
4. Pentru a procesa proba, apăsați ferm pe partea superioară a mânerului sondei de prelevare a probelor din 3M Clean-Trace Proteine Test alergenic [figura 4]. Mânerul va intra în tubul dispozitivului de testare, iar partea de sus a mânerului trebuie să se afle la același nivel cu partea de sus a tubului dispozitivului, dacă acesta este apăsat complet. Prindeți partea de sus a dispozitivului și scuturați rapid dintr-o parte în alta timp de cel puțin cinci secunde pentru a amesteca proba și reactivul [figura 5]. Soluția va avea culoarea verde mentă.
5. Plasați 3M Clean-Trace Proteine Test alergenic într-un bloc de încălzire care a fost preîncălzit la 55 °C. Încălziți timp de 15 minute la 55 °C. Comparați culoarea tamponului și soluției cu eticheta 3M Clean-Trace Proteine Test alergenic. Înregistrați cea mai puternică schimbare de culoare pe tampon sau în soluție ca rezultat final.

Utilizarea cea mai eficientă a 3M Clean-Trace Proteine de suprafață Test alergenic	
Indicații	Interdicții
Țineți 3M Clean-Trace Proteine Test alergenic în poziție VERTICALĂ la activare și scaturați rapid dintr-o PARTE ÎN ALTA timp de cel puțin 5 secunde.	Nu activați dispozitivul dacă nu este în poziție verticală, nu îl agitați de sus în jos, nu îl scaturați puternic.
Incubați 3M Clean-Trace Proteine Test alergenic vertical.	Nu incubați 3M Clean-Trace Proteine Test alergenic orizontal.
Citiți valoarea 3M Clean-Trace Proteine Test alergenic la 15 minute.	Nu înregistrați modificările de culoare după 15 minute.

Interpretarea

Culoarea reacției testului va indica nivelul de reziduuri de proteine pe suprafață. Comparând culoarea rezultată cu eticheta 3M Clean-Trace Proteine Test alergenic, se poate estima nivelul de curățare a suprafetei.

- Verde indică un rezultat Pozitiv - Curat, nu necesită acțiuni suplimentare.
- Gri indică un rezultat neconcludent - Se recomandă să curătați și să testați din nou.
- Violet indică un rezultat Negativ - Clătiți din nou și testați din nou.

La încălzire, culoarea verde mentă pălește și soluția devine transparentă cu o nuanță albastră pentru mostrele negative; culoarea verde revine la răcire, la scurt timp după scoaterea din blocul de încălzire. Se recomandă apelarea la comparația cu un ser de control negativ pentru a ajuta interpretarea.

Pentru informații suplimentare, contactați Serviciul Tehnic 3M Food Safety.

Explicarea simbolurilor

www.3M.com/foodsafety/symbols

3M Food Safety

3M United States

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-800-328-6553

3M Canada

Post Office Box 5757
London, Ontario N6A 4T1
Canada
1-800-563-2921

3M Latin America

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-954-340-8263

3M Europe and MEA

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Strasse 1
D41453 Neuss/Germany
+49-2131-14-3000

3M United Kingdom PLC

Morley Street, Loughborough
Leicestershire
LE11 1EP
United Kingdom
+(44) 1509 611 611

3M Österreich GmbH

Euro Plaza
Gebaude J, A-1120 Wien
Kranichberggasse 4
Austria
+(43) 1 86 686-0

3M Asia Pacific

No 1, Yishun Avenue 7
Singapore, 768923
65-64508869

3M Japan

3M Health Care Limited
6-7-29, Kita-Shinagawa
Shinagawa-ku, Tokyo
141-8684 Japan
81-570-011-321

3M Australia

Bldg A, 1 Rivett Road
North Ryde, NSW 2113
Australia
611300 363 878



3M Health Care

2510 Conway Ave
St. Paul, MN 55144 USA
www.3M.com/foodsafety

© 2017, 3M. All rights reserved.
3M is a trademark of 3M. Used under license in Canada.
34-8721-8852-8



Clean-Trace™

Инструкции к препарату

Тест для определения белка (аллергена) на поверхности

Описание и предназначение продукта

3M™ Clean-Trace™ Тест для определения белка (аллергена) на поверхности основывается на биуретовой реакции. В щелочных условиях ионы меди (Cu^{2+}) образуют комплекс с пептидными связями белка и сокращаются до Cu^+ . Бицинхониновая кислота (ВСА) в щелочных условиях является высокочувствительным, устойчивым и специфическим реагентом, который образует фиолетовый комплекс с Cu^+ . Тест позволяет оценить количество белка на основании изменения цвета. 3M Clean-Trace Тест для определения белка (аллергена) представляет собой чувствительный тампон для обнаружения белка. Предел обнаружения составляет примерно 3 мкг общего белка (с использованием бычьего сывороточного альбумина в качестве контрольного вещества). Абсолютный предел будет варьироваться в зависимости от состава белка в тестируемых образцах. При тестировании поверхностей, оборудования и промывочных растворов следует иметь в виду, что остатки могут содержать смесь аллергенных и неаллергенных белков, а также небелковые вещества.

Чтобы дать некоторые рекомендации по интерпретации результатов, в компании 3M было проведено тестирование. Оно показало, что положительный результат теста «3M Clean-Trace Тест для определения белка (аллергена)» может свидетельствовать о наличии следующих приблизительных минимальных количеств аллергенных веществ.






Справочный материал

Предел обнаружения аллергенов	Используемый материал	Содержание белка (%)
Яйцо 10–20 мкг	Цельный яичный порошок NIST SRM8415	30
Молоко 10–20 мкг	Цельный молочный порошок NIST SRM8435	25,9
Арахис 25–50 мкг	Арахисовое масло NIST SRM2387	22,2
Глютен 40 мкг	Глютеновая мука (местного происхождения)	~83
Соя 20–40 мкг	Соевая мука (местного происхождения)	~46,5
Миндаль 20–40 мкг	Цельный миндаль (местного происхождения)	~19,5
Гречиха 20–40 мкг	Гречневая мука (местного происхождения)	~13

3M Clean-Trace Тест для определения белка (аллергена) может использоваться для обнаружения белковых остатков на поверхностях и в растворе, что позволяет определять эффективность очистки в плане удаления белков, включая потенциально аллергенные белки. Однако интерпретация результатов будет варьироваться в зависимости от конкретной сферы применения, поэтому пользователям рекомендуется проверить предлагаемый метод на соответствие их конкретным требованиям.

⚠ Предупреждения

Дополнительную информацию и местные нормативные требования в отношении утилизации отходов см. в паспортах безопасности.





⚠ Предостережения

Белок — довольно распространенное вещество. Оно присутствует на коже, волосах и на многих поверхностях. Не трогайте тампон или тестируемую поверхность.

Не используйте 3M Clean-Trace Тест для определения белка (аллергена) после истечения срока годности.

3M Clean-Trace Тест для определения белка (аллергена) обнаруживает белок и поэтому не способен обнаруживать остатки продуктов с низким или нулевым содержанием белка.

Хотя 3M Clean-Trace Тест для определения белка (аллергена) очень чувствителен, поверхность не может считаться безаллергенной на основании результата этого теста.

Взаимодействие с большинством обычных дезинфицирующих средств при нормальных концентрациях является минимальным. Однако в некоторых случаях использование щелочных очистителей в высоких концентрациях может приводить к ложноотрицательным результатам. Дезинфицирующие средства на основе пероксида могут вызывать ложноположительную реакцию с изменением цвета при использовании теста «3M Clean-Trace Тест для определения белка (аллергена)».

ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пользователи несут полную ответственность за ознакомление с инструкциями и информацией об использовании продукта. Для получения более подробной информации посетите наш веб-сайт по адресу www.3M.com/foodsafety либо свяжитесь с вашим местным представителем или дистрибутором 3M.

При выборе метода исследования важно понимать, что на результаты исследования могут влиять внешние факторы, например метод забора проб, протокол исследования, подготовка проб к исследованию, способы обработки проб во время исследования, а также используемое оборудование.

За выбор метода исследования и исследуемого продукта отвечает пользователь. Пользователь должен на основании исследования достаточного количества образцов с помощью надлежащих матриц и микробных провокационных проб определить, отвечает ли выбранный метод исследования необходимым ему критериям.

Пользователь также несет ответственность за то, что выбранный им метод исследования отвечает требованиям его клиентов или поставщиков.

Результаты, полученные с помощью продукта 3M Food Safety (как и при использовании любого другого метода исследований), не гарантируют качество матриц или технологических процессов, подвергавшихся исследованиям.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ / ОГРАНИЧЕННАЯ ЗАЩИТА ПРАВ

ЕСЛИ ИНОЕ ЯВНО НЕ УКАЗАНО В РАЗДЕЛЕ ОБ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ПРОДУКТА, 3M НЕ ПРИЗНАЕТ ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИЮ ТОВАРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАННОЙ ОБЛАСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ. Если качество продукта отдела безопасности пищевой продукции компании 3M не является надлежащим, компания 3M или уполномоченный этой компанией дистрибутор обязуется по своему усмотрению заменить этот продукт или возместить стоимость покупки этого продукта. Это единственный способ разрешения спора. О возможном дефекте необходимо немедленно уведомить компанию 3M в течение шестидесяти дней с момента его обнаружения, после чего вернуть продукт в компанию 3M. Для санкционирования возврата товара позвоните в Службу поддержки клиентов (1-800-328-1671 в США) или своему официальному представителю отдела Контроля возврата компании 3M.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ 3M

3M НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРЯМЫМИ, НЕПРЯМЫМИ, УМЫШЛЕННЫМИ, СЛУЧАЙНЫМИ ИЛИ КОСВЕННЫМИ, ВКЛЮЧАЯ ПОМИМО ПРОЧЕГО УТРАЧЕННУЮ ПРИБЫЛЬ. Ответственность компании 3M ни при каких обстоятельствах и несмотря ни на какие требования не может превышать стоимость продукта.



Хранение и утилизация

Для обеспечения максимального срока годности храните устройство при температуре 2–25 °C (36–77 °F). Кроме того, тампоны сохраняют свои свойства в течение 14 дней в случае транспортировки или хранения при повышенной температуре. В таком случае температура хранения не должна превышать 35 °C (95 °F). Срок годности и номер партии указаны на каждом пакетике. После использования может содержать микроорганизмы, которые могут представлять потенциальную биологическую опасность. Утилизируйте продукт в соответствии с действующими отраслевыми стандартами.

Инструкции по применению

Прежде чем начать процедуру тестирования, убедитесь в том, что баня сухого нагрева, водяная баня или инкубатор включены и на них установлена температура 55 °C (131 °F).

- Перед использованием подержите 3M Clean-Trace Тест для определения белка (аллергена) при комнатной температуре не менее 10 минут. Возьмитесь за ручку пробоотборной палочки и извлеките тампон из устройства. На сухих поверхностях используйте входящий в комплект увлажнитель и нанесите 4 капли на тампон ИЛИ нанесите 4 капли на тестируемую поверхность (рисунок 1).
- Протрите тампоном тестовый участок. Если возможно, протрите участок размером примерно 10 x 10 см, двигаясь вначале в одном направлении, а затем — в противоположном (рисунок 2). В ходе взятия образца надавливайте на тампон и вращайте его, чтобы обеспечить многократный и эффективный забор (рисунок 3). Для тестирования раствора погрузите тампон в образец и удалите излишки жидкости о стенку сосуда.
- Примечание.** Если тестируется раствор, проведите тест на присутствие дезинфицирующего агента (например, проверку pH) в образцах жидкости.
- Вставьте пробоотборную палочку в тест, при этом ручка должна быть установлена в исходное положение, как в неиспользованном teste. На этом этапе вы можете сразу же активировать тест и провести измерение или же, если вам так удобнее, можете маркировать 3M Clean-Trace Тест для определения белка (аллергена) и оставить его неактивированным на срок до четырех часов, а затем активировать и провести измерение нескольких тампонов одновременно.
- Для обработки образца с усилием надавите сверху вниз на ручку пробоотборной палочки теста «3M Clean-Trace Тест для определения белка (аллергена)» (рисунок 4). Ручка пройдет в трубку устройства. Полностью погруженная ручка должна быть на одном уровне с верхней частью трубы устройства. Возьмитесь за верхнюю часть устройства и быстро встряхните из стороны в сторону в течение как минимум пяти секунд, чтобы смешать образец и реагент (рисунок 5). Раствор приобретет мягко-зеленый цвет.
- Поместите 3M Clean-Trace Тест для определения белка (аллергена) в нагревательный блок, который был предварительно нагрет до 55 °C (131 °F). Нагревайте в течение 15 минут при температуре 55 °C (131 °F). Сопоставьте цвет тампона и раствора с цветовой шкалой на этикетке теста «3M Clean-Trace Тест для определения белка (аллергена)». В качестве конечного результата зафиксируйте наиболее сильное изменение цвета в растворе или на тампоне.

Как правильно использовать 3M Clean-Trace Тест для определения белка (аллергена) на поверхности

Да	Нет
Держать 3M Clean-Trace Тест для определения белка (аллергена) в ВЕРТИКАЛЬНОМ положении при активации и быстро встряхивать ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ в течение как минимум 5 секунд.	Активировать не в вертикальном положении, встряхивать вверх и вниз, встряхивать слишком интенсивно.
Инкубировать 3M Clean-Trace Тест для определения белка (аллергена) вертикально.	Инкубировать 3M Clean-Trace Тест для определения белка (аллергена) горизонтально.
Считывать результаты теста «3M Clean-Trace Тест для определения белка (аллергена)» через 15 минут.	Фиксировать любые изменения цвета по истечении 15 минут.



Интерпретация результатов

Цвет после реакции теста будет указывать на уровень белковых остатков на поверхности. Сопоставив полученный цвет с цветовой шкалой на этикетке теста «3M Clean-Trace Тест для определения белка (аллергена)», можно выполнить оценку чистоты поверхности.

- Зеленый цвет обозначает результат «Удовлетворительно» — чисто, дополнительных действий не требуется.
- Серый цвет обозначает неоднозначный результат — рекомендуется повторная очистка и повторное тестирование.
- Фиолетовый цвет обозначает результат «Неудовлетворительно» — требуется повторная очистка и повторное тестирование.

При нагревании мятно-зеленый цвет исчезает и становится прозрачным с синим оттенком для отрицательных образцов. При охлаждении зеленый цвет восстанавливается вскоре после извлечения из нагревательного блока. Для упрощения интерпретации рекомендуется сравнение с отрицательным контрольным образцом.

Для получения дальнейшей информации свяжитесь с технической службой отдела безопасности пищевой продукции компании 3M.

Пояснение символов

www.3M.com/foodsafety/symbols

3M Food Safety

3M United States

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-800-328-6553

3M Canada

Post Office Box 5757
London, Ontario N6A 4T1
Canada
1-800-563-2921

3M Latin America

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-954-340-8263

3M Europe and MEA

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Strasse 1
D41453 Neuss/Germany
+49-2131-14-3000

3M United Kingdom PLC

Morley Street, Loughborough
Leicestershire
LE11 1EP
United Kingdom
+(44) 1509 611 611

3M Österreich GmbH

Euro Plaza
Gebaude J, A-1120 Wien
Kranichberggasse 4
Austria
+(43) 1 86 686-0

3M Asia Pacific

No 1, Yishun Avenue 7
Singapore, 768923
65-64508869

3M Japan

3M Health Care Limited
6-7-29, Kita-Shinagawa
Shinagawa-ku, Tokyo
141-8684 Japan
81-570-011-321

3M Australia

Bldg A, 1 Rivett Road
North Ryde, NSW 2113
Australia
611300 363 878



3M Health Care

2510 Conway Ave
St. Paul, MN 55144 USA
www.3M.com/foodsafety

© 2017, 3M. All rights reserved.
3M is a trademark of 3M. Used under license in Canada.
34-8721-8852-8

Ürün Talimatları

Yüzey Protein Alerjen Testi

Ürün Tanımı ve Kullanım Amacı

3M™ Clean-Trace™ Yüzey Protein Alerjen Testi için Biüre reaksiyonu temel alınmıştır. Alkali koşullar altında bakır iyonları (Cu^{2+}) proteinin peptit bağlarıyla bileşik oluşturur ve Cu^{+} ya indirgenir. Alkali koşullarda bisinkonik asit (BCA), Cu^{+} ile mor renkli bir bileşik oluşturan yüksek hassasiyetli, stabil ve spesifik bir reaktiftir. Test, renk değişimiyle proteinin hesaplanması sağlar. 3M Clean-Trace Protein Alerjen Testi, (kontrol olarak Sığır Serum Albumininin kullanıldığı) toplam proteinin yaklaşık 3 µg'ı kadar bir algılama limitine sahip duyarlı bir protein algılama svabidir. Mutlak limit, test edilen numunelerin protein bileşimine göre değişir. Yüzeyler, ekipmanlar ve durulama çözetileri test edilirken, bir kalıntıının alerjen olan ve olmayan proteinlerin yanı sıra protein dışı maddelerin bir karışımını içerebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Sonuçların yorumlanması konusunda rehberlik sağlama için 3M'de gerçekleştirilen testler, 3M Clean-Trace Protein Alerjen Testi sonucunun şu yaklaşık minimum alerjen ürün miktarlarına karşılık gelebileceğini ortaya koymuştur:

Referans Madde

Alerjen Algılama Limiti	Kullanılan Madde	Protein İçeriği (%)
Yumurta 10-20 µg	NIST SRM8415 Tam yumurta tozu	30
Süt 10-20 µg	NIST SRM8435 Tam süt tozu	25,9
Yerfıstığı 25-50 µg	NIST SRM2387 Yerfıstığı ezmesi	22,2
Gluten 40 µg	Gluten unu (yerel kaynaklı)	~83
Soya 20-40 µg	Soya unu (yerel kaynaklı)	~46,5
Badem 20-40 µg	Tam badem (yerel kaynaklı)	~19,5
Karabuğday unu 20-40 µg	Karabuğday unu (yerel kaynaklı)	~13

3M Clean-Trace Protein Alerjen Testi, yüzey ve çözeltilerdeki protein kalıntılarını tespit etmek ve böylece temizleme işleminin, alerjenik potansiyele sahip proteinler dahil olmak üzere proteinlerin giderilmesinde etkili olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir. Ancak sonuçların yorumlanması, uygulamaya bağlı olarak farklılık gösterdiğinden kullanıcıların bu yöntemi kendi özel gereksinimlerine uygun olarak doğrulaması önerilir.

⚠ Uyarılar

Ek bilgiler ve ürünün imha edilmesi ile ilgili yerel düzenlemeler için Güvenlik Veri Formu'na bakın.

⚠ Dikkat

Protein yaygın bir maddedir. Deri, saç ve birçok yüzeye bulunur. Test edilecek svaba veya yüzeye dokunmayın.






3M Clean-Trace Protein Alerjen Testini son kullanım tarihinden sonra kullanmayın.

3M Clean-Trace Protein Alerjen Testi proteini algıladığından protein içeriği düşük veya sıfır olan ürünlerin kalıntılarını algılamaz.

3M Clean-Trace Protein Alerjen Testi çok hassas olmasına rağmen, 3M Clean-Trace Protein Alerjeni Testi sonucuna dayanarak bir yüzey alerjenlerden arınmış olarak değerlendirilemez.

Normal konsantrasyonlardaki yaygın sanitizerlerle etkileşim minimum düzeydedir. Ancak yüksek konsantrasyonlarda alkali temizleyiciler, bazı durumlarda yanlış negatif sonuçlar verebilir.

Peroksit bazlı dezenfektanlar, 3M Clean-Trace Protein Alerjen Testinde yanlış pozitif denk değişimine yol açabilir.



Kullanıcının Sorumluluğu

Kullanıcılar ürün önerileri ve bilgileri hakkında bilgi edinmekle yükümlüdür. Daha fazla bilgi için www.3M.com/foodsafety adresini ziyaret ediniz ya da yerel 3M temsilcinizle veya dağıtımınızla iletişim kurunuz.

Bir test yöntemi seçilirken, numune alma yöntemleri, test protokoller, numunenin hazırlanması, işlem yapılması ve laboratuvar teknigi gibi dış faktörlerin sonuçları etkileyebileceğinin bilinmesi gereklidir.

Seçilen test yönteminin kullanıcının kriterlerini karşıladığı konusunda kullanıcıyı tatmin edecek uygun matrisler ve mikrobiyal zorluklarla yeterli sayıda numuneyi değerlendirmek üzere herhangi bir test yönteminin seçilmesi kullanıcının sorumluluğundadır.

Tüm test metodlarının ve sonuçlarının müşterilerin ve tedarikçilerin gereksinimlerini karşılamasını sağlamak yine kullanıcının sorumluluğundadır.

Tüm test yöntemlerinde olduğu gibi, herhangi bir 3M Gıda Güvenliği ürününün kullanılmasından elde edilen sonuçlar test edilen matrislerin veya süreçlerin kalitesi konusunda bir garanti oluşturmaz.

Garantilerin Sınırlandırılması / Sınırlı Çözüm

3M, HER BİR ÜRÜN AMBALAJININ ÜZERİNDEKİ SINIRLI GARANTİ KISMINDA AÇIKÇA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, PAZARLANABİLİRİLİK VEYA BELİRİLİR BİR KULLANIMA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HİÇBİR AÇIK VEYA ZİMNİ GARANTİYİ KABUL ETMEMEKTEDİR. Herhangi bir 3M Gıda Güvenlik Ürünü'nün kusuru olmasa durumunda, 3M veya yetkili dağıtıcı, tercihine göre ürünü değiştirecek veya ürün satışını iade edecktir. Tarafınıza münhasır çözümler bunlardır. Üründe mevcut olduğundan kuşku duyulan herhangi bir kusurun fark edilmesinden sonraki altmış gün içinde durumu 3M'e bildiriniz veya ürünü 3M'e iade ediniz. Mal İade İzni almak için lütfen Müşteri Hizmetleri'ni (A.B.D.'de 1-800-328-1671) veya yerel resmi 3M Gıda Güvenliği temsilcini arayın.

3M Sınırlı Sorumluluğu

3M DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ VEYA NETİCE KABİLİNDEN DOĞMUŞ, KAYBEDİLMİŞ KAZANCLAR DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR KAYIP VEYA ZARARDAN SORUMLU OLMIYACAKTIR. Hiçbir durumda 3M'in herhangi bir hukuk kuramı altındaki sorumluluğu, kusuru olduğu iddia edilen ürünün satış fiyatını aşamaz.

Saklama ve İmha

Maksimum raf ömrü için 2-25°C (36-77°F) arası sıcaklıklarda saklayın. Alternatif olarak, svablar yüksek sıcaklıklarda taşıındığında veya saklandığında 14 gün boyunca stabil olduğundan, bu saklama seçeneği için 35°C (95°F) sıcaklığın üstüne çıkmayı. Son kullanma tarihi ve lot numarası her poşetin üzerine yazılmıştır. Kullanım sonrası potansiyel biyolojik tehlike olabilen mikroorganizmalar içerebilir. İmha için geçerli endüstri standartlarını izleyin.

Kullanım Talimatları

Test prosedürüne başlamadan önce kuru banyo ve sulu banyo uygulayın veya inkübatörün çalışır durumda ve 55°C (131°F) sıcaklığı ayarlanmış olduğundan emin olun.

1. 3M Clean-Trace Protein Alerjen Testini kullanmadan en az 10 dakika önce oda sıcaklığına getirin. Numune çubuğuunun sapını tutun ve svabı cihazdan çıkarın. Kuru yüzeylerde, ürünle birlikte verilen nemlendiriciyi kullanın ve svaba VEYA test edilecek yüzeye 4 damla uygulayın [şekil 1].
2. Test alanına svabı sürtün. Uygulanabilir olduğunda, yaklaşık 10 cm'e 10 cm gelen bir alana svabı sürtün ve svabı söz konusu alanda tek bir yönde ve daha sonra aksi yöne sürtün [şekil 2]. Svaba basınç uygulayın ve tekrarlanabilir ve etkili bir numune alma işlemin yapıldığından emin olmak için numuneyle birlikte svabı da döndürün [şekil 3]. Bir çözeltiyi test etmek için svabi numuneye daldırın ve fazlalık sıvıyı kabin kenarında giderin.

Not: Bir çözeltinin test edilmesi durumunda, sıvı numunelerinde sterilizasyon maddesi olup olmadığını test edin (örneğin, pH kontrolü).

3. Numune çubuğu, tutma yeri kullanılmamış testin ilk konumuna yerleşecek biçimde teste yerleştirin. Bu noktada etkinleştirip hemen ölçülebilir veya daha kolay olması durumunda, 3M Clean-Trace Protein Alerjen Testi etiketleyip, birden fazla svabin aynı anda etkinleştirilip ölçülmesinden dört saat öncesine kadar etkinleştirilmemiş halde bırakabilirsiniz.
4. Numuneyi çalışmak için 3M Clean-Trace Protein Alerjen Testi numune çubuğuunun sapını aşağı doğru sıkıca bastırın [şekil 4]. Sap kısmı kayarak cihaz tüpüne girecek ve tamamen bastırıldığından tutma yerinin üst kısmı ile cihaz tüpünün üst kısmı aynı hızda olacaktır. Cihazın üst tarafını kavrayın ve numune ile reaktifi karıştırmak için en az beş saniye boyunca bir taraftan diğer tarafa hızlı bir şekilde sallayın [şekil 5]. Çözelti nane yeşiline dönebilir.

5. 3M Clean-Trace Protein Alerjen Testini, önceden 55°C (131°F) sıcaklığına getirilmiş bir ısıtma bloğuna yerleştirin. 55°C (131°F) sıcaklıkta 15 dakika ısıtin. Svabın ve çözeltinin rengini, 3M Clean-Trace Protein Alerjen Testi etiketiyle karşılaşırın. Çözelti veya svab üzerindeki en güclü renk değişimini, nihai sonuç olarak kaydedin.

3M Clean-Trace Yüzey Protein Alerjen Testinin en iyi şekilde kullanımı	
Yapılacaklar	Yapılmayacaklar
3M Clean-Trace Protein Alerjen Testini etkinleştirdikten sonra DİK konumda tutun ve en az 5 saniye boyunca sağa-sola çalkalayın.	Dikey konumda değilken etkinleşirmeyin, yukarı aşağı sallamayın, sert sallamaktan kaçının.
3M Clean-Trace Protein Alerjen Testini dikey olarak inkübe edin.	3M Clean-Trace Protein Alerjen Testini yatay olarak inkübe etmeyin.
3M Clean-Trace Protein Alerjen Testini 15 dakika sonra okuyun.	15 dakikadan sonraki hiçbir renk değişimini kaydetmeyin.

Yorumlama

Test reaksiyonunun rengi, yüzeydeki protein kalıntılarının seviyesini gösterir. Elde edilen rengi 3M Clean-Trace Protein Alerjen Testi etiketiyle karşılaşırılarak yüzey temizliğine ilişkin bir belirlemede bulunulabilir.

- Yeşil renk, sonucun Başarılı olduğunu gösterir - Temizdir ve başka bir işlem gerekmekz.
- Gri renk sonuçsuzdur - Temizlik ve test tekrarı önerilir.
- Mor renk, sonucun Başarısız olduğunu gösterir - Tekrar temizleyin ve tekrar test edin.

Isıtma durumunda nane yeşili rengi solar ve negatif numuneler için mavi tonuya şeffaflaşır. Isıtma bloğundan çıkarıldıkta kısa süre sonra soğumasının ardından yeşil renge geri döner. Yorumlamaya yardımcı olmak için negatif kontrol ile karşılaştırma önerilir.

Daha fazla bilgi için 3M gıda Güvenliği Teknik Servisler bölümü ile iletişime geçin.

Sembollerin Açıklaması

www.3M.com/foodsafety/symbols

3M Food Safety

3M United States

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-800-328-6553

3M Canada

Post Office Box 5757
London, Ontario N6A 4T1
Canada
1-800-563-2921

3M Latin America

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-954-340-8263

3M Europe and MEA

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Strasse 1
D41453 Neuss/Germany
+49-2131-14-3000

3M United Kingdom PLC

Morley Street, Loughborough
Leicestershire
LE11 1EP
United Kingdom
+(44) 1509 611 611

3M Österreich GmbH

Euro Plaza
Gebaude J, A-1120 Wien
Kranichberggasse 4
Austria
+(43) 1 86 686-0

3M Asia Pacific

No 1, Yishun Avenue 7
Singapore, 768923
65-64508869

3M Japan

3M Health Care Limited
6-7-29, Kita-Shinagawa
Shinagawa-ku, Tokyo
141-8684 Japan
81-570-011-321

3M Australia

Bldg A, 1 Rivett Road
North Ryde, NSW 2113
Australia
611300 363 878



3M Health Care

2510 Conway Ave
St. Paul, MN 55144 USA
www.3M.com/foodsafety

© 2017, 3M. All rights reserved.
3M is a trademark of 3M. Used under license in Canada.
34-8721-8852-8



Clean-Trace™

製品情報

アレルゲン残留測定

製品の概要および用途

3M™クリーントレース™アレルゲン残留測定は、ビューレット反応を基本原理に利用しています。アルカリ条件下では、銅イオン(Cu^{2+})はタンパク質のペプチド結合と複合体を形成し、 Cu^{+} に還元されます。また、アルカリ性条件下のビシンコニン酸(BCA)は、高感度で安定的かつ特異的な試薬となり、 Cu^{+} と結びついて紫色の錯体を形成します。BCA法では、色の変化からタンパク質を測定できます。3Mクリーントレースアレルゲン残留測定は、高感度のタンパク質検出用スワブです。検出限界は総タンパク質量約3 μg です(対照としてウシ血清アルブミンを使用しています)。絶対検出限度は、測定する検体のタンパク質組成に応じて変化します。表面、装置、洗浄液を測定する際は、残留物にアレルギー性タンパク質と非アレルギー性タンパク質が混在すると同時に、非タンパク質物質も存在する可能性がありますのでご注意ください。

結果を判定する際の目安として社内試験を行ったところ、3Mクリーントレースアレルゲン残留測定が陽性である場合は、以下のアレルギー性物質が最小質量で存在する可能性のあることが示されました。

基準物質

アレルゲンの検出限界	対象物質	タンパク質含有量(%)
卵 10~20 μg	NIST SRM8415 全卵粉末	30
乳 10~20 μg	NIST SRM8435 全脂粉乳	25.9
ピーナッツ 25~50 μg	NIST SRM2387 ピーナッツバター	22.2
グルテン 40 μg	グルテン粉(現地調達)	約83
大豆 20~40 μg	大豆粉(現地調達)	約46.5
アーモンド 20~40 μg	アーモンド(ホール、現地調達)	約19.5
そば 20~40 μg	そば粉(現地調達)	約13

3Mクリーントレースアレルゲン残留測定を使用すると、表面や溶液中の残留タンパクを検出できます。これにより、洗浄がアレルギー性タンパク質などのタンパク質除去に有効かどうかを判定できますが、特定用途に応じて結果の解釈が異なりますので、特定要件に対して解釈法を検証することをおすすめします。

△ 警告

廃棄に関する詳細および行政の規制については、製品安全データシートを参照してください。

△ 注意






タンパク質はどこにでも存在する物質です。皮膚や毛髪、その他多くの表面に存在しています。スワブや拭き取り面に触れないでください。

3Mクリーントレースアレルゲン残留測定の使用期限が過ぎている場合は、使用しないでください。

3Mクリーントレースアレルゲン残留測定はタンパク質を検出するため、タンパク質が少ないか含まれない残留物は検出されません。

3Mクリーントレースアレルゲン残留測定は非常に高感度ですが、3Mクリーントレースアレルゲン残留測定を使用した検査の結果に基づいてアレルゲンが含まれないと判定することはできません。

通常濃度であれば、大半の一般的な殺菌剤からはほとんど影響を受けません。ただし、高濃度のアルカリ性洗浄剤については、場合によって測定結果が偽陰性となることがあります。過酸化物系の消毒剤は、3Mクリーントレースアレルゲン残留測定を使用すると、偽陽性の変色反応を生じることがあります。





お客様の使用責任

お客様には、使用前に添付文書および製品情報を熟読し、情報に精通する責任があります。詳細につきましては、当社ウェブサイト www.3M.com/foodsafetyをご覧いただくか、お近くの3M販売担当者または販売店にお問い合わせください。

検査方法を選択する際には、サンプリング方法、検査プロトコル、サンプルの準備、取り扱い、および検査手技などの外的要因が結果に影響することを認識することが重要です。

お客様の基準を満たすように、適切な食材および菌株を用いた十分な数のサンプルを評価するための検査方法または製品を選択することは、お客様の責任となります。

また、その検査方法および結果が顧客あるいは供給業者の要求を満たしているかについても、お客様の判断となります。

どの検査方法を使用した場合でも、3M食品衛生管理製品を使用して得られた結果により、検査で使用した食材または工程中の品質を保証するものではありません。

保証の限定／限定救済策

個々の製品パッケージの限定保証条項に明示されている場合を除き、3Mは明示または默示を問わず、商品性または特定の目的への適合性に関する保証を含むがこれに限定されない、あらゆる種類の保証も負いかねます。3M食品衛生部門の製品に欠陥があった場合、3Mまたは取扱販売店で交換あるいは返品処理をいたします。対応は上記のみとさせていただきます。製品の欠陥が疑われる場合は、判明した時点から60日以内にすみやかに3Mに通知し、製品を3Mに返送する必要があります。返品可否についてはカスタマーサービスにお電話にてご連絡いただくか、お近くの3M食品衛生部門までお問い合わせください。

3Mの保証責任範囲

3Mは、直接的・間接的、特殊、偶発的または必然的を問わず、利益損失を含むがこれに限定されないあらゆる損失に対しての責任を放棄します。いかなる場合においても、あらゆる法的理論に対しても、3Mの保証責任範囲は、欠陥と認められた製品の購入金額を超えることはありません。

保管と廃棄

可能な限り長期間保管できるよう、2~25°Cで保管してください。また、高温で輸送または保管すると、スワブは14日間安定性を維持します。高温で保管する場合は、35°Cを超えないようにしてください。各バッグには使用期限とロット番号が表示されています。使用後は、バイオハザードをもたらすおそれのある菌が混在している場合があります。現行の廃棄基準に従って廃棄してください。

使用方法

測定の開始前に、必ずドライバス、水槽、培養器の電源を入れ、55°Cに設定してください。

1. 使用前に、3Mクリーントレースアレルゲン残留測定を10分間以上室温で静置します。サンプルスティックのハンドルを握り、プラスチック容器からスワブを取り出します。拭き取り面が乾燥している場合には、スワブもしくは拭き取り面に、付属のモイスチャライザーを4滴滴下します[図1]。
2. 測定対象の場所を拭き取ります。可能な場合は、約10 cm x 10 cm四方をスワブで拭き取ります。最初に一方向に拭き取ってから、反対方向に拭き取ってください[図2]。検体を採取する際は、スワブを強く押し付けて回転させ、検体を繰り返し効果的に採取できるようにします[図3]。溶液を測定する際は、スワブを検体に浸し、容器の側面で余分な液を落としてください。

注: 溶液を測定する場合は、液体検体中に消毒剤が存在するかどうかを検査してください(例:pHチェック)。

3. サンプルスティックを容器に戻し、未使用の場合の元の位置にハンドルを挿入します。この時点ですぐに反応させて読み取ることができます。また、都合に合わせて、3Mクリーントレースアレルゲン残留測定にラベルを貼付し、未反応の状態で最大4時間静置してから、複数のスワブを同時に反応させて読み取ることもできます。
4. 検体の処理を行うには、3Mクリーントレースアレルゲン残留測定のサンプルスティックのハンドルを上からしっかりと押し込みます[図4]。スティックのハンドルを容器に挿入し、完全に押し込んだ状態でハンドルの上部とチューブの上部が同じ高さになるようにします。容器の上部をしっかりと持ち、5秒間以上素早く左右に振って検体と試薬を混合します[図5]。溶液が緑色に変わります。
5. 55°Cに予熱したヒートブロックに、3Mクリーントレースアレルゲン残留測定を挿入します。55°Cで15分間加熱します。3Mクリーントレースアレルゲン残留測定のラベルと、スワブと溶液の色を比較します。溶液またはスワブに最も強く出た色の変化を最終結果として記録してください。



3M クリートレース アレルゲン残留測定を正しくお使いいただくには

推奨事項(してもいいこと)	禁止事項(してはいけないこと)
反応させる際は、3M クリートレース アレルゲン残留測定を垂直に持ち、5秒間以上素早く左右に振る。	容器を垂直に持たずに反応させる。上下に振らないこと。また、激しく振らないこと。
3M クリートレース アレルゲン残留測定を垂直に立てて培養する。	3M クリートレース アレルゲン残留測定を横置きして培養する。
15分後に3M クリートレース アレルゲン残留測定を読み取る。	15分以降の色の変化を記録する。

判定

試薬反応の色は、拭き取り面上のタンパク残留濃度を示しています。発色を3M クリートレース アレルゲン残留測定のラベルと比較することで、拭き取り面の清浄度を測定できます。

- ・ 緑色:合格 - 清浄、これ以上の対応は不要。
- ・ 灰色:判定なし - 再洗浄と再測定を推奨。
- ・ 紫色:不合格 - 再洗浄、再測定。

加熱すると緑色が薄くなり、陰性検体が示す青みがかった色に変化します。緑色はヒートブロックから取り出した直後に冷却すると、元の色に戻ります。解釈の参考になるよう、陰性対照と比較してください。

詳細については、3M食品安全部門技術サービスまでお問い合わせください。

記号の説明

www.3M.com/foodsafety/symbols

3M Food Safety

3M United States

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-800-328-6553

3M Canada

Post Office Box 5757
London, Ontario N6A 4T1
Canada
1-800-563-2921

3M Latin America

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-954-340-8263

3M Europe and MEA

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Strasse 1
D41453 Neuss/Germany
+49-2131-14-3000

3M United Kingdom PLC

Morley Street, Loughborough
Leicestershire
LE11 1EP
United Kingdom
+(44) 1509 611 611

3M Österreich GmbH

Euro Plaza
Gebaude J, A-1120 Wien
Kranichberggasse 4
Austria
+(43) 1 86 686-0

3M Asia Pacific

No 1, Yishun Avenue 7
Singapore, 768923
65-64508869

3M Japan

3M Health Care Limited
6-7-29, Kita-Shinagawa
Shinagawa-ku, Tokyo
141-8684 Japan
81-570-011-321

3M Australia

Bldg A, 1 Rivett Road
North Ryde, NSW 2113
Australia
611300 363 878



3M Health Care

2510 Conway Ave
St. Paul, MN 55144 USA
www.3M.com/foodsafety

© 2017, 3M. All rights reserved.
3M is a trademark of 3M. Used under license in Canada.
34-8721-8852-8



Clean-Trace™

产品信息

表面过敏原采样棒

产品说明及预期用途

3M™ Clean-Trace™ 表面过敏原采样棒基于双缩脲反应。在碱性条件下,铜离子 (Cu^{2+}) 与蛋白质肽键形成络合物,并被还原为 Cu^+ 。二喹啉甲酸 (BCA) 在碱性条件下是一种高度敏感、稳定且特有的试剂,能与 Cu^+ 形成紫色络合物。该检测试剂盒通过颜色变化预计蛋白质含量。3M Clean-Trace 表面过敏原采样棒是一种敏感的蛋白质检测涂抹棒,检测限制约为 3 μg 总蛋白质(使用牛血清白蛋白作为对照)。绝对限制将因检测样品的蛋白质组成而异。检测表面、设备和冲洗液时,必须注意残留可能含有过敏性和非过敏性蛋白质混合物以及非蛋白质物质。

为提供一定的结果判读指导,在 3M 进行的检测显示,3M Clean-Trace 表面过敏原采样棒阳性结果可能相当于以下近似最低量的过敏性产品:

参考物质

过敏原检测限制	所用物质	蛋白质含量 (%)
鸡蛋 10-20 μg	NIST SRM8415 全蛋粉	30
牛奶 10-20 μg	NIST SRM8435 全脂奶粉	25.9
花生 25-50 μg	NIST SRM2387 花生酱	22.2
麸质 40 μg	高筋粉(本地采购)	~83
大豆 20-40 μg	大豆粉(本地采购)	~46.5
杏仁 20-40 μg	完整杏仁(本地采购)	~19.5
荞麦 20-40 μg	荞麦粉(本地采购)	~13

3M Clean-Trace 表面过敏原采样棒可用于检测表面上和溶液中的蛋白质残留,从而确定清洁是否已有效消除蛋白质,包括潜在过敏性蛋白质。然而,结果判读将根据具体应用而有所不同,因此建议用户验证适于其具体要求的方法。

△ 警告

请参考安全数据表了解其它信息和当地处置法规。

△ 小心

蛋白质是一种常见物质。它存在于皮肤、头发和许多其他表面上。请勿触摸涂抹棒或者待检表面。

请勿使用过期的 3M Clean-Trace 表面过敏原采样棒。

3M Clean-Trace 表面过敏原采样棒用来检测蛋白质,因此无法检测蛋白质含量低或无蛋白质产品上的残留。

虽然 3M Clean-Trace 表面过敏原采样棒非常敏感,但仅根据 3M Clean-Trace 表面过敏原采样棒结果,还不能判定表面无过敏原。


多数正常浓度的普通消毒剂造成的干扰极小。然而,高浓度的碱性清洁剂可能在某些情况下导致假阴性结果。过氧化物类消毒剂可与 3M Clean-Trace 表面过敏原采样棒反应,导致假阳性颜色变化。

用户责任

用户负责熟悉产品说明和信息。请访问我们的网站 www.3M.com/foodsafety 或联系您当地的 3M 代表或经销商,以了解更多信息。

选择检测方法时,务必认识到各种外部因素(如取样方法、检测方案、样品制备、处理和实验室技术)都可能会影响结果。

用户在选择检测方法时,应自行负责选用合适的基质和微生物激发试验对足够多的样品进行评估,以确保所选择的检测方法符合用户的标准。





检测方法及结果能否满足客户及供应商的要求也由用户负责。

同所有检测方法一样, 使用任何 3M 食品安全产品得到的结果, 并不保证受检基质或程序的质量。

保证限制/有限补救措施

除非各个产品包装的有限保证部分明确声明, 3M 就所有明示或默示保证做出免责声明, 包括但不限于适销性及适合某种特定用途的保证。如果证明任何 3M 食品安全产品存在缺陷, 3M 或其授权经销商可以进行换货或者由其决定是否为该产品进行退款。这些都是专门针对您而设计的解决方案。您必须在发现产品中存在任何可疑缺陷的 60 天内立即通知 3M, 并将该产品退给 3M。请致电客户服务部门(1-800-328-1671 美国)或联系您的 3M 食品安全官方代表以获得退货授权。

3M 责任限制

3M 不会对任何损失或损害负责, 无论造成的损害是直接、间接、特殊、偶然或随后产生的, 包括但不限于利润损失。根据法律理论 3M 对所谓存在缺陷的产品的赔付不可能超过产品的购买价格。

存储和弃置

为保证最长的有效期, 请在 2-25°C (36-77°F) 下存储。或者, 若在高温下运输或存储, 涂抹棒在 14 天内保持稳定; 这种存储选择的温度不得超过 35°C (95°F)。每个包装袋上都注明了失效日期和批号。使用之后可能包含微生物, 这有可能会导致生物危害。请根据当前的行业标准进行处置。

使用说明

开始检测程序前, 确保干浴、水浴或培养设备打开并设置为 55°C (131°F)。

1. 使用前, 将 3M Clean-Trace 表面过敏原采样棒置于室温下至少 10 分钟。抓紧采样棒手柄并从装置中取出涂抹棒。在干燥表面使用提供的保湿液并在涂抹棒上涂抹 4 滴或在待检表面上涂抹 4 滴 [图 1]。
2. 拭抹待检区域。在实践当中, 请拭抹大约 10 x 10 cm 的区域, 先从一个方向拭抹, 然后从相反方向拭抹 [图 2]。在涂抹棒上加些压力, 采样后旋转涂抹棒, 以确保可重复和有效的采样 [图 3]。检测溶液时, 将涂抹棒浸入样品并清除采样管侧面的任何多余液体。
- 注:** 若检测溶液, 则检测液体样品中是否存在消毒剂(例如, pH 检查)。
3. 将采样棒重新插入检测装置, 手柄插入检测装置未用时的原始位置。此时, 可立即启动和测量, 为了更加方便, 还可为 3M Clean-Trace 表面过敏原采样棒贴上标签并最多保持四小时不启动, 之后再同时启动和测量多个涂抹棒。
4. 处理样品时, 请用力向下按压 3M Clean-Trace 表面过敏原采样棒手柄顶端 [图 4]。手柄将滑入装置管中, 当完全压下后, 手柄的顶端应与装置管的顶端平齐。抓紧装置顶端并从一侧到另一侧快速摇晃至少五秒钟, 以混合样品和试剂 [图 5]。溶液将变为薄荷绿色。
5. 将 3M Clean-Trace 表面过敏原采样棒置于预热至 55°C (131°F) 的加热块内。在 55°C (131°F) 下加热 15 分钟。将涂抹棒和溶液颜色与 3M Clean-Trace 表面过敏原采样棒标签进行对比。记录溶液或涂抹棒中最明显的变化作为最终结果。

如何充分利用 3M Clean-Trace 表面过敏原采样棒

正确	不正确
启动时以垂直位置握持 3M Clean-Trace 表面过敏原采样棒并从一侧到另一侧快速摇晃至少 5 秒钟。	不在垂直位置启动时, 请勿上下晃动, 不要剧烈摇晃。
垂直培养 3M Clean-Trace 表面过敏原采样棒。	水平培养 3M Clean-Trace 表面过敏原采样棒。
15 分钟时读取 3M Clean-Trace 表面过敏原采样棒。	记录 15 分钟后的任何颜色变化。

判读

检测反应的颜色将指示表面残留的蛋白质水平。将产生的颜色与 3M Clean-Trace 表面过敏原采样棒标签进行对比, 可以得出预计表面清洁度。

- 绿色指示合格结果 - 清洁, 无需进一步操作。
- 灰色为无定论 - 建议重新清洁并重新检测。
- 紫色指示不合格结果 - 重新清洁并重新检测。

对于阴性样品, 加热期间, 薄荷绿色将褪色并变得透明, 并带点浅蓝色; 从加热块中取出不久, 将因冷却而变回绿色。为帮助判读, 建议对比阴性对照。

有关详细信息, 请联系 3M 食品安全技术服务中心。

符号说明

www.3M.com/foodsafety/symbols

3M Food Safety

3M United States

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-800-328-6553

3M Canada

Post Office Box 5757
London, Ontario N6A 4T1
Canada
1-800-563-2921

3M Latin America

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-954-340-8263

3M Europe and MEA

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Strasse 1
D41453 Neuss/Germany
+49-2131-14-3000

3M United Kingdom PLC

Morley Street, Loughborough
Leicestershire
LE11 1EP
United Kingdom
+(44) 1509 611 611

3M Österreich GmbH

Euro Plaza
Gebaude J, A-1120 Wien
Kranichberggasse 4
Austria
+(43) 1 86 686-0

3M Asia Pacific

No 1, Yishun Avenue 7
Singapore, 768923
65-64508869

3M Japan

3M Health Care Limited
6-7-29, Kita-Shinagawa
Shinagawa-ku, Tokyo
141-8684 Japan
81-570-011-321

3M Australia

Bldg A, 1 Rivett Road
North Ryde, NSW 2113
Australia
611300 363 878



3M Health Care

2510 Conway Ave
St. Paul, MN 55144 USA
www.3M.com/foodsafety

© 2017, 3M. All rights reserved.
3M is a trademark of 3M. Used under license in Canada.
34-8721-8852-8